

200 × 180 mm

판시모 캡슐

일반 의약품
K G M P
우수의약품지정업체

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

* 유효성분 : 약용효모(별규)	100 mg
(히스티딘 1.0mg, 로이신 3.0mg, 리신 3.1mg)	
케라틴(별규)	20 mg
(히스티딘 0.22mg, 로이신 1.88mg, 리신 1.0mg)	
티아민질산염(KP)	60 mg
판토텐산칼슘(KP)	60 mg
L-시스틴(KP)	20 mg
p-아미노벤조산(USP)	20 mg

* 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호, 황색5호
* 첨가제(동물유래성분) : 경질캡슐(젤라틴)(소/가축)(돼지/가축), 케라틴(돼지/발톱)
* 기타 첨가제 : 경질무수구산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 캡슐제

[성상]
연회색 가루의 내용물이 든 상부는 녹색, 하부는 미황색의 불투명한 경질캡슐제

[효능·효과]
1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

[용법·용량]
성인 : 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용하십시오.
12세 이상 소아 : 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용하십시오.
12세 미만은 복용하지 마십시오.

- [사용상의 주의사항]
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 - 12세 미만 소아
 - 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분과 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
 - 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 위통, 구토 등 위장관 불편감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
 - 두부이외의 신체부위에서 발모현상이 나타는 경우
 - 정해진 용법·용량대로 3 ~ 4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우
 - 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 설펜아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.

- 흡터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
- 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.
- 평균 치료 기간은 3 ~ 6개월이다.

5. 저장상의 주의사항
- 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 25°C이하 보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 90캡슐/상자(10캡슐/PTP x 9), 180캡슐/상자((10캡슐/PTP x 9)x2), 270캡슐/상자((10캡슐/PTP x 9)x3)

■ 제조자 : 맥널티제약(주)
충청남도 천안시 서북구 성환읍 올금3길 46



■ 제조의뢰자 · 판매원 : 한국프라임제약(주)
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100



- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)
- ※ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.