

■ ■ ■ 의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

멜로신정45밀리그램 (브로멜라인)

일반의약품

부종 및 염증 완화

● 원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분 :
브로멜라인(별규) 45mg
- 동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 포비돈, 카르복시메틸셀룰로오스칼륨, 클로이드성아산화규소, 스테아르산마그네슘, 오파드라이흰색(85F18422), 아크릴이소하렌색(93018509), 적색산화철, 황색산화철

● 성 상 분홍색 장방형의 작용성 필름코팅정

● 효능·효과 부종을 동반한 염증 증상의 완화, 외상 또는 수술 후의 부종

- 용법·용량 성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 45~90mg, 1일 3회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다.
체내에서의 작용기전의 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병)
- 2) 심한 간 또는 심한 신질환 환자(혈액투석환자 등)
- 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.)
- 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 5) 12세 미만의 소아
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.)

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지 할 것.

- 1) 과민반응 : 이 약에 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다.
- 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

● 저장방법 기밀용기, 25℃이하 보관

● 사용기간 제조일로부터 24 개월

● 포장단위 500정/병, 1000정/병

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : MLST 2020.12.07 (I-201207)