

■■■ 의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

속편엔

이중정

일반의약품

이중효과 소화제
(위에서·장에서)

● 원료약품 및 분량 1정 중

• 유효성분 :	
판크레아틴(KP)	(전분당화력 378단위이상, 단백소화력 5112단위이상, 지방소화력 155단위이상) 40mg
우르소데옥시콜산(JP)	10mg
시메티콘(USP)	30mg
• 첨가제(타르색소) :	적색40호알루미늄레이크
• 동물유래성분 :	유당수화물 (소/우유)
• 기타첨가제 :	미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼륨, 스테아르산마그네슘, 아크릴이소판(85F18422), 적색산화철

● 성 상 연한 빨간색의 원형 필름코팅정

● 효능·효과 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

● 용법·용량 만 15세 이상 및 성인 1회 1~2정 1일 3회 식후복용

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(gluco-se-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지 할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

● 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

● 사용기간 제조일로부터 36개월

● 포장단위 10정/상자(10정/피티파), 20정/상자(10정/피티파x2), 90정/상자(10정/피티파x9), 100정/병, 500정/병

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223) ※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : SPNT 2020.12.01 (I-201201)