

에버포스™ 정

일반의약품

안전용기 · 포장

자양강장 | 허약체질 | 영양장애 | 육체피로

EVERFORCE™ Tab.

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

유효성분 : L-류신(KP).....	17mg
L-메티오닌(KP).....	15mg
L-발린(KP).....	15mg
L-이소류신(KP).....	15mg
L-트레오닌(KP).....	10mg
L-페닐알라닌(KP).....	10mg
L-트립토판(KP).....	5mg
L-리신염산염(KP).....	18.75mg
L-아르기닌염산염(KP).....	10mg
티아민질산염(KP).....	5mg
토코페롤수시네이트칼슘(KP).....	2.5mg
리보플라빈(KP).....	2mg
니코틴아미드(KP).....	15mg
피리독신염산염(KP).....	7.5mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스티라르산마그네슘, 이소프레이적색 (GMIK26B), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨

■ 성상 : 진한갈색의 장방형 필름코팅정

■ 효능 · 효과

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후), 위장

장애, 영양장애, 발열성소모질환, 임신수유기 등의 경우의 영양보급.

■ 용법 · 용량

15세이상 청소년 및 성인 : 1회 2정, 1일 1~2회 복용


소아(7세~14세) : 1회 1정, 1일 1~2회 복용

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 중증의 신부전환자
 - 7세미만 소아
 - 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것 (복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 · 수유부
- 부작용
 - 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 위부부과감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변
 - 이 약 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
 - 에스트로젠을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인 이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

- 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다
- 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈 증(hyperuricemia : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 일반적 주의
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여한다.
 - 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
- 상호작용
 - 이약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
 - 가) 레보도파
- 임상 검사치에의 영향
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 오 · 남용을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것 또한 사용기한 내에 있더라도 개봉 후 6개월 이내에 복용할 것 (품질유지를 위한)
 - 다른 용기에 옮겨 보관하지 말 것.
- 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
- 포장단위 : 120정, 240정
- 제조원 : 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52(제조의리차) (주)마더스제약 - 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18(제조자)

※ 안전용기 개봉방법



- 1 병뚜껑을 위에서 아래로 힘껏 누른다.
- 2 뚜껑을 누른 상태에서 시계 반대방향으로 돌린다.
- 3 뚜껑을 연다.

- ※ 본 첨부문서 문단 개정일자(2021년 07월 09일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234) 에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
- ※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.
- ※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
- ※ 이 제품의 포장에 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 포장을 사용하여 약 의 잘못 사용, 남용 및 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.