



액티진 Actizin BTS Tab. 비티에스®정

일반의약품
분류번호 : 319

고 함 량 기 능 성 활 성 비 타 민



육체피로 체력저하 눈의 피로 신경통 근육통 어깨결림 관절통 구각·구순염 구내염 피부염 수족저짐 수족냉증 잇몸출혈

[원료약품 및 그 분량]

·유효성분	
벤포티아민(KP)	45mg
(티아민염산염으로서 32.53mg)	
비타민B12(KP)	5mg
(티아민염산염으로서 4.375mg)	
리보플라빈(KP)	25mg
니코틴아미드(KP)	50mg
판토텐산칼슘(KP)	50mg
피리독신염산염(KP)	100mg
비오틴(USP)	0.05mg
폴산(KP)	0.4mg
시아노코발라민(KP)	1mg
아노시톨(KP)	50mg
클린타르타르산염(DAB)	20mg
아스코르브산(KP)	50mg
(아스코르브산으로서 50mg)	
토코페롤하이드레이트 2배산(KP)	20mg
(비타민D로서 10IU)	
산화아연(KP)	15mg
(아연으로서 12mg)	
셀레늄 함유 건조 효모(KP)	100mg
(셀레늄으로서 150µg)	
산화마그네슘(KP)	250mg
(마그네슘으로서 150mg)	
농축클레칼시페롤 과립(KP)	10mg
(클레칼시페롤로서 1,000IU)	
우르소데옥시콜산(KP)	10mg
김바오리자놀(KP)	5mg

- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 바닐라미크론, 스테아르산마그네슘, 저지화도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 폴리도싱에이션화구소, 펄빅도산핵(21Y024), 펄빅도클레이(71C152), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 황갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 1. 다음증상의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C의 보충

- 육체피로, - 임신 · 수유기, - 병중 · 병후 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, - 발육기, - 노인기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 비타민 D (원료약품및그분량의 " 농축클레칼시페롤과립 ") , - 비타민 B1, (원료약품및그분량의 " 벤포티아민 ") , - 비타민 B2, (원료약품및그분량의 " 리보플라빈 ") , - 비타민 B6 (원료약품및그분량의 " 피리독신염산염 ")

3. 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저짐·수족냉증 (손발이 차가움)

- 4. 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

5. 뼈, 이의 발육발달 6. 구루병의 예방 7. 각기 8. 눈의피로 9. 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착

기미, 주근깨의 완화 10. 잇몸출혈 11. 비출혈(코피) 예방

[용법·용량] 성인 1회1정, 1일 1회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵), 신장 질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 첫아이 (4) 신장결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자 (6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당불내효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (4) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (5) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 신장배담체를 투여 중인 환자 (9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 (10) 신장결석 병력이 있는 환자 (11) 임부 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 부분문서를 소지할 것. (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 딸 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (7) 고용량투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (8) 대장투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(붓기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (10) 항알도스테론제, 트리안테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 (11) 우발적으로 과량복용 한 경우 (12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. (2) 각종 요염사이에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (3) 요를 황색으로 변화하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 유효한 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. (3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 60정 / 병, 120정 (60정 / 병) 2 [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월 [소비자상담실] 070-4924-7379(수신자부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다. ※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어하여 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원 ☎1644-6223

한국코러스

[제조자] 충청북도 제천시 강서로 30

[판매자] 경기도 화성시 남양읍 무하로 66

PK-63009-001, 2021.01.13

영진약품