

약국에서 만나는 빠른 회복

팜편안-디

정 소화불량 위부불쾌감 위부팽만감

• 원료의약품 및 그 분량 : 1정 중

■ 유효성분 : 메타규산알루미늄산마그네슘(KP)	40mg
(《건조물이며》산화알루미늄으로서 12.92mg, 산화마그네슘으로서 5.08 mg)	
탄산수소나트륨(KP)	50mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(별규)	20mg
(전분당화력 (pH 4.5) 278 단위, 단백소화력(pH 3.0) 170 단위)	
스코폴리아엑스(KP)	5mg
(총 알칼로이드[하요시아민](C ₁₇ H ₂₃ NO ₃ : 289.37 및 스코폴라민(C ₁₇ H ₂₁ NO ₄ : 303.35)]로서 50μg)	
리파제(별규)	7.5mg
(지방소화력(pH 6.0) 45 단위)	
감초가루(생규)	25mg
(글리시리진산으로서 0.63mg)	
침강탄산칼슘(KP)	100mg
트리메부틴말레산염(KP)	50mg

■ 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 황색 4호, 청색 1호

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

■ 기타첨가제 : 박하유, 스테아르산마그네슘, 오파드라이그린038610039, 옥수수전분, 저치한도히드록시프로필셀룰로오스, 폴로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈

• 성상 : 녹색의 원형 필름코팅정제

• 효능 · 효과 : 위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 식체(위체(체합)), 구역, 구토, 위통, 신트림, 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

• 용법 · 용량

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용

• 사용상 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증)을 일으킨 일이 있는 환자

2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

3) 신(신장)장애 환자

4) 간장애 환자

5) 의사의 치료를 받고 있는 환자

6) 이 약은 황색4호(타르 트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움증)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

2) 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(어지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

3) 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

4) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.

5) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)

2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자

3) 부종(부기)이 있는 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제(이 약)의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기 연용(계속 복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔 다리)경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 차이지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

7. 일반적 주의

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.

2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.

8. 상호작용

위장진통, 진경(경련완화)제와 병용 투여(함께 복용)하지 않는다.

9. 소아 · 임부에 대한 투여

1) 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.

2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.

10. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

• 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

• 사용기한 : 케이스 옆면 참조

• 포장단위 : 30정/상자(10정/PTP×3)

• 제조자 : (주)마더스제약 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 18

• 제조회사 : 코스맥스파마(주) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

• 판매자 : (주)휴베이스 서울 서초구 방배로 227 영춘빌딩201,205호

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견 될 경우는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자(2021.03.04)이후 변경된 내용이나 자세한 품목 허가 또는 신고사항은 본사(031-8018-0364)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

작성일 : 2021년 03월 04일

PPT1210304