

※ 이 문서는 이 약을 사용하시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관하십시오.



I-00

글루원정

(gluone.Tab.)

일반의약품



[원료약품 및 그 분량] 1정(380mg) 중

- 유효성분 : 글루타민(KP) 120mg
탄산칼슘(USP) 140mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스2910, 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 흰색 원형의 필름코팅정

[효능·효과]

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체한, 구역, 구토, 위통, 신트림

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1회 2정, 1일 3회

식후 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용하며, 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 7세 이하의 어린이
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose mal absorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 신장장애 환자
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
- 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
- 3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오염(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[포장단위] 1000정/병, 500정/병, 30정/병
[사용기한] 제조일로부터 36개월
[소비자상담실] 080-597-1020
[부작용보고] 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

F02627

문서작성일 : 2021.01.18



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박외로 316 17B-2L
www.i-pharm.kr