조 제 용
일반의약품
분류번호:321

디카테오엘씨 정

고함량 비타민D + 시트르산칼슘

KGMP
적 격 업 체

[원료약품의 분량] 1정 중
▪유효성분: 시트르산칼슘수화물(USP) ····· 480mg(칼슘으로서 101.12mg)
농축콜레칼시페롤 과립(EP) ····· 10mg(비타민D로서 1000IU, 양의 털, 소의 가죽)
▪기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

[성상] 흰색의 장방형 정제

[효능·효과]
1. 다음 경우의 비타민 D의 보급
- 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
• 뼈, 이의 발육불량
• 구루병의 예방

[용법·용량]
성인 및 만 8세 이상 어린이 : 1일 1회 1정을 복용

[사용상의 주의사항]
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
3) 만 12개월 미만의 젖먹이
4) 신장결석 환자
5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
4) 신장장애 환자
5) 저단백혈증 환자
6) 강심배당체를 투여 중인 환자
7) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
5) 우발적으로 과량복용 한 경우
6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 30정, 90정
[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
[최종개정연월일] 2021.02.01
[제조자] (주)다림바이오텍 강원도 원주시 지정면 신평로 33

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

dalim (주)다림바이오텍

(주)다림바이오텍 강원도 원주시 지정면 신평로 33
대표전화 : 02) 335-1656 / 소비자상담실 : 080) 333-1656(수신자부담)
공장 및 연구소 : 033) 738-4600 / 한국의약품안전관리원 : 1644-6223

ver.00