



8 806438 033816

신신 건강한 눈을 위한 비타민A 영양제 클리어뷰

연결캡슐



VITAMIN A 8,000 I.U

비타민 6종 복합 처방

VITAMIN A, E, B1, B2, B6, C

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 사용상의 주의사항을 주의 깊게 읽어 주시길 바랍니다.

[유효성분]	1캡슐(1300mg) 중
---------------	---------------

니코틴산아미드(KP) 15mg, 레티놀팔미테이트(비타민A로서 8000IU)(KP) 4.705mg, 리보플라빈부티레이트(KP) 6mg, 무수인산수소칼슘(칼슘으로서 14.73mg, 인으로서 11.38mg)(KP) 50mg, 비오틴(USP) 0.045mg, 산화마그네슘(마그네슘으로서 6.03mg)(KP) 10mg, 산화아연(아연으로서 4.02mg)(KP) 5mg, 셀레늄함유 건조효모(셀레늄으로서 50μg)(KP) 92.6mg, 아스코르브산(KP) 100mg, 토포페롤아세테이트(비타민E로서 100IU)(KP) 100mg, 티아민질산염(KP) 5mg, 판토텐산칼슘(KP) 30mg, 폴산(KP) 0.2mg, 푸마르산철(철로서 10.03mg)(KP) 30.5mg, 파라독신염산염(KP) 1mg, 황산당간수화물(당간으로서 0.65mg)(USP) 2mg, 황산제이구리(구리로서 0.5mg)(EP) 1.26mg

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 A, E, B1, B2, B6, C 의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
- 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨, 목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조번호], [사용기한](연. 월. 일. 까지)

별도표기

[첨가제]

- 첨가제(동물유래성분): 숙신산젤라틴(기원동물: 돼지, 사용부위: 가죽)
- 기타첨가제: 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 에틸바닐린, 치자청색소, 카카오색소, 콩기름, 폴리소르베이트80, 향남

[사용상의 주의사항]

1. 경고

(1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것 (2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사상을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는곳에 보관할 것.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 월경증 (5) 혈액소중혈체 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환, 헤모시테린침착증, 비철결핍성 빈혈 (6) 신장결석 환자 (7) 심한 증상의 신부전 환자 (8) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (9) 콩 또는 병중에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월 까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가 추정되는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치로 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. (4) 소화성궤양, 만성궤양, 대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 (5) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장(콩팥)장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 강성배당체를 투여 중인 환자 (9) 당뇨병(췌장관련 질환, 간질환 환자 (10) 통풍증 또는 신장결석이 있는 환자 (11) 임부 (12) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유래를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부(상복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종종 붉어짐), 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동률증가, 피부발진, 두드러기, 광선과민반응, 복부 위증증, 경련, 열, 혼수, 상복부(배부)통증, 묽은 변, 부전수축(심장부동맥), 중추신경계 기능저하, 피부염, 말초혈류 장애, 탈모, 조골증, 위장관(장자)장애, 소화장애, 폐부종

(부기) (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다 (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증(혈관막힘)의 위험이 증가될 수 있다 (4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다 (5) 파라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화가 나타남)을 유발할 수 있다 (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다 (7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다 (8) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다 (9) 장기간 고용량의 비타민 A(비타카로틴)로부터 전환된 것을 제외한 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈의 상층) 위험을 높일 수 있다 (10) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여함에 복용시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 (11) 우발적으로 과량복용한 경우 (12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜 것 (2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다 (3) 각종 요강사시에도 혈당의 검출을 방해할 수 있다 (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다 (5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것 (6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체지방률이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼합되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 (2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것 (3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[성상] 갈색 내용물을 함유한 암갈색 장방형 연결캡슐

[포장단위] 30캡슐(10캡슐/PTP*3)

[제조사] (주)알피바이오, 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

[제조의뢰자] 신신제약(주), 세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9

소비자상담실: 02) 2030-1745, www.sinsin.com

★ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

★ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질 변색 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.

★ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

[첨부문서 작성일자] 2021년 02월 02일