

(트리메부틴말레산염)

트리엘 정 100mg

일반의약품

【제품명】 트리엘정100밀리그램(트리메부틴말레산염)

【원료약품 및 그 분량】 1정(230mg) 중

■ 유효성분

트리메부틴말레산염(KP) 100mg

■ 첨가제 (동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제 : 콜로이드성이산화규소, 옥수수전분, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

1. 주 효능 · 효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극, 수면장애

【포장단위】 10정/PTP, 1000정/병

【용법·용량】 성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여(복용)한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이상반응

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름증), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지한다.

【제조사】 경방신약(주) / 인천광역시 남동구 남동대로 394 【판매지】 일양약품(주)/경기도 용인시 기흥구 하갈로 110(하갈동)

【소비자상담실】 1599-7199

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.