

엘카딘정(L-카르니틴)

■ 의약품구분 : 일반의약품

■ 원료약품 및 분량

▶ 유효성분 :

L-카르니틴 (USP)-----330mg

▶ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 오파드라이AMBII 흰색(88A180040), 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

■ 성상 : 흰색의 원형 필름코팅정

■ 효능·효과 :

- 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
- 허혈성심질환에 의한 심근대사장애 : 협심증, 급성심근경색

■ 용법·용량 :

성인 : 엘-카르니틴으로서 1일 2~3g을 2~3회 분할 경구투여한다.(먹는다, 복용한다)

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약에 과민증 환자

2. 부작용

일시적인 구역·구토, 복통(배아픔), 설사, 체취가 나타날 수 있다.

이 약을 복용한 환자에서 발진, 두드러기, 안면부종이 보고되었다.

이 약을 복용한 요독증 환자에서 경증의 근무력증(근육무력증)이 보고되었다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 대한 안정성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃뚝, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유 중에는 신중히 투여한다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ **사용기간** : 제조일로부터 36개월

■ **포장단위** : 90 정/상자(10정/피티피*9)

■ **바코드** : 8806218042212

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 「의약품 등 정보」를 참조하세요.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 : www.pharvis.co.kr 에서 확인 할 수 있습니다.

※ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

제조의뢰자 : (주)한국파비스제약 / 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127

제조사 : (주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354