

목아플 땀(인·후두염엔) 트로안텍트로키 오렌지 THROANDTECT TROCHE

079344-001

[원료약품 및 그 분량] 1정(1,000mg) 중,

- 유효성분: 벤지다민염산염(BP).....3.00mg
세틸피리디늄염화물(BP).....1.00mg
- 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 시트르산수화물, 아스파탐, 오렌지미크론, 페퍼민트미크론 B5010, D-만니톨, D-소르비톨, L-렌톨

[성상]

오렌지향이 나는 흰색 내지 미백색의 원형 트로키제

[효능·효과]

다음 질환에 의한 통증 및 염증 완화 및 살균:
치은염, 구내염, 인두염, 후두염, 발치 전·후

[용법·용량]

성인 및 만 12세 이상 소아:

1일 3~4회 (사용간격은 최소 2시간 이상), 1회 1정을 씹거나 삼키지 말고
입안에서 천천히 녹여 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 경고
 - 1) 아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한 한 최소량 사용)할 것. [60kg 성인: 1일 최대복용량 2.4g]
 - 2) 이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 만 6세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사와 상의할 것
 - 1) 과당불내증 환자(이 약은 소르비톨을 함유하고 있음)
 - 2) 임신 또는 수유 중이거나, 임신 또는 수유를 계획 중인 사람
 - 3) 만 6세 이상 ~ 만 12세 미만의 소아
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사와 상의할 것.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

 - 1) 적용부위에 과민반응이 발생한 경우
 - 2) 용량을 초과하여 복용한 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 잊어버린 용량을 보충하기 위하여 증량하지 말아야 한다.
 - 2) 양치질 직전 또는 직후에는 복용하지 않는다.
 - 3) 이 약을 다른 살균제와 동시에 사용하는 것은 피해야 한다.
 - 4) 만 6세 이상 ~ 만 12세 미만의 소아는 의사의 처방이 없는 경우 이 약을 복용하지 않는다.
 - 5) 이 약은 운전 또는 기계조작에 영향을 주지 않는다.

- 6) 이 약의 복용은 10일을 초과하지 않아야 하며, 뚜렷한 효과를 느끼지 못한 경우 의사와 상의해야 한다.
- 7) 국소 마취 작용과 관련된 입 안에 가벼운 감각저하 증상이 발생할 수 있다.
- 8) 가벼운 일시적 작열감과 같은 불내성 증상이 발생할 수 있지만, 이 증상으로 인해 사용을 중단할 필요는 없다.
- 9) 두드러기, 광과민성 및 기관지경련 등을 포함한 과민반응이 나타날 수 있다.
- 10) 구강 또는 목의 국소자극 또는 작열감이 나타난 경우, 이 약을 구강점막의 동일 위치에 오랫동안 적용하지 않으면 피할 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[포장단위] 18 정/팩(6정/PTP × 3)**[저장방법]** 기밀용기, 실온보관(1~25℃)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의사사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오.

▪ 제조원: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

설명서 최종 개정 연월일: 2021. 4. 22

Dongkook 동국제약