

**비디디셀정 25mg**

(비페닐디메틸디카르복실레이트)

**비디디셀정 25mg**

(비페닐디메틸디카르복실레이트)

**【원료약품 및 그 분량】 1정(250mg) 중**

- 유효성분 : 비페닐디메틸디카르복실레이트(별표) ..... 25.0mg
- 첨가제(동등유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 스테아르산나그네솔, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈

**【성 상】** 흰색의 원형 정제이다**【효능·효과】** 지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염**【용법·용량】** 성인 : 비페닐디메틸디카르복실레이트로서 1회 25~50mg, 1일 3회 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.**【사용상의 주의사항】****1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.**

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

**2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**

- 1) 만성 활동성 간염 환자
- 2) 간경변 환자

**3. 이상반응**

- 1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 합과민약을 병용투여하면 소실된다.
- 2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 합달 치료제를 병용투여하면 소실된다.
- 3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.

**4. 상호작용 : 이노신(inosine)과 함께 투여 시에, 제발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.**

5. 일부 및 수유부에 대한 투여 : 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부에는 투여하지 않는다.

**6. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.****7. 임상검사에 영향**

- 치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다.  
투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.

**8. 보관 및 취급상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 덮개 보관한다.

**【포장단위】** 30정/병, 300정/병**【저장방법】** 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)**【사용(유효)기간】** 제조일로부터 36개월**【제조주의회사】** (주)아리제약(충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 3 충북테크노파크 생명기업관

B02호, B15호, B17-1호, B17-2호, 103호, 203호, 204호, 205호, 206호, 215호, 216호, 217호, 313호, 314호, 315호)

**【제조자】** (주)파마킹(충청북도 음성군 갑곡면 해군이길 87-17)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2022년 09월 07일 이후 변경된 내용은 소비자상담실(070-4105-2553)로 문의 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품정보를 참조하십시오.
- ◆ 사용(유효)기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.
- ◆ 본 제품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 첨부문서는 본 제품과 함께 보관하십시오.
- ◆ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)