

만성 증증 손 습진 치료제

아리톡 연질캡슐 20mg

(알리트리레티노인)

【원료약품 및 분량】1캡슐 중

- 유효성분: 알리트리레티노인(별규).....10.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 소신산콜라린(S, 가축)
- 기타 첨가제: 뉴클리세린, 소르비톨소르비탄 액, 적색산화철, 정제수, 중세트리글리세리드, 글리콜, 황산, 흑색산화철, d-α-토코페롤

【성 상】노란색의 유상내용물을 함유한 갈색의 타원형 연질캡슐제

【효능효과】

최소 4주간의 강력한 국소 스테로이드 치료에도 반응하지 않는 성인의 만성 증증 손습진(IPGA(physician's global assessment)따라 평가)

【용법용량】

- 1일 1회 10~30mg을 식사와 함께 또는 식사 직후 복용한다. 매일 같은 시간에 복용하는 것이 바람직하다.
- 초기용량으로 알리트리레티노인으로서 30mg을 투여하고, 이상반응에 따라 10mg으로 감량한다.
- 당초, 비만, 심혈관계 위험요소가 있거나 이상지질혈증 환자 : 초기 용량으로 10mg을 투여하고 내약성과 효과에 따라 필요시 30mg으로 증량할 수 있다. 이 약을 투여하는 동안 주기적으로 혈중 지질 프로파일 및 혈당 확인이 필요할 수 있다.
- 손이 깨끗해지거나 거의 깨끗해지는 치료 목표에 도달하면 바로 투여를 중단한다.

초기 12주 치료 후에도 손습진의 정도가 증진일 경우 치료를 중단하고, 치료 24주까지 치료 목표에 도달하지 못한 경우에도 투여를 중단한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 이 약은 기형아 유발성(배기형성)이 매우 높으므로, 임부 또는 임신 가능성이 있는 모든 여성에게 금기이다. 이 약 치료도중 임신할 경우에는 투여용량이나 투여기간에 상관없이 기형아 유발 가능성이 매우 높다. 이 약에 노출된 모든 태어는 잠재적으로 영향을 받을 수 있다.
가. 이 약은 환자가 다음의 모든 조건을 갖추지 않는 한, 임신 가능성이 있는 여성 환자에게 금기이다.
(1)최기형의 위험성을 잘 이해하고 있는 환자
(2)이 약 치료까지 1개월 전부터 치료 도중 및 치료 종료 1개월 후까지 필수적 이고 효과적인 피임대책(상보적인 2가지 피임법)을 지속적으로 실시할 수 있는 환자
(3)최조식기 11일 이내의 임신감사에서 음성으로 밝혀진 환자(임신검사 및 피임에 대한 상담은 치료종료 후, 5주까지 매일 반복하도록 한다. 이를 위해 의사는 1개월분 이상의 약을 처방하지 않아야 한다. 검사는 생리주기의 첫 3일 이내에 하고, 검사결과를 확인한 뒤로 치료를 시작한다)
(4)이 약 치료 도중 및 치료 종료 후 1개월 이내에 임신할 경우의 위험성에 대하여 의사로부터 충분한 설명을 듣고, 피임상태가 여성성에 대하여 경고를 받은 환자
(5)우월적인 임신 가능성에 대해 잘 인지하고 있으며 임신의 위험이 있을 시에는 의사의 진찰을 받을 수 있는 환자
(6)이 같은 사용상의 주의사항을 충분히 이해하고, 이해하는 것 확인되고, 설명된 대로 신신헌만한 피임대책을 실시할 의사가 있는 환자
(7)무월경일지라도 피임의 경고를 준수해야 한다.
나. 이 약의 처방을 받기 전에 정상적인 생리주기의 첫 3일 이내에 실시한 소변이나 혈청 임신감사에서 최소한 25 mIU/mL 감도의 음성결과를 측정되어야 한다. 임신감사 시기는 환자 개인별 생리주기 및 성교 시기 등에 따라 결정되고, 피임하지 않은 성교 후에도 3주 후에 검사를 실시한다. 치료사 환자는 치료사 소변이나 혈청 임신감사에서 음성결과가 확인되어야 한다. 임신감사는 매번 처방을 받기에 앞서 매일 반복되어야 한다. 처방과 조제는 같은 날 이루어지는 것이 이상적이며 처방전은 최장 7일 이내에 조제 되도록 한다.
- 이 약의 초기형성으로 인한 위험 발생을 최소화 하고자 임신예방프로그램을 운영한다. 의사 및 약사는 임신예방프로그램을 숙지하고 이 약을 처방 및 조제하여야 하며, 환자는 이 프로그램에서 경고하고 있는 사항에 동의하고 이를 준수하여야 한다. (일일제 주의항 참조)
- 혈청 중성지방치수가 800 mg/dL(9 mmol/L)을 초과하면 지혈형인 금색혈관염을 유발할 수 있으므로, 임상적으로 유의한 혈청 중성지방수치 상승은 조절하도록 권장된다. 고중성지방혈증이 조절되지 않거나 재발성 증상이 나타나면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
- 이 약은 전신 레티노이드 사용경험과 증증의 만성 손습진의 치료 경험이 있는

의사에 의해 처방되고 모니터링 되어야 한다.

2. 다른 환자에는 투여하지 않 것

- 임부, 수유부 및 임신 가능성이 있는 여성 환자
- 간장애 환자
- 중증의 신장애 환자
- 감상성기능저하증 환자
- 비타민A 과다증 환자
- 이 약과 이 약의 구성성분 및 다른 레티노이드 약물에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
- 테트라사이클린을 복용하는자
- 고콜레스테롤혈증, 고중성지방혈증 환자
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 공 또는 병공에 과민증이 있는 환자

3. 다른 환자에는 신중히 투여할 것

- 정신 질환을 경험한 환자. 전신 레티노이드 치료를 받은 환자에서 우울증, 우울증의 악화, 불안, 분노, 감정의 불안정, 정신과적 증상 및 드물게는 자살관념, 자살시도 및 자살이 보고되었다. 우울증의 병력이 있는 경우 주의가 요구되며, 우울증의 증추가 있는지 감진과 모니터링 하고 필요시 적절한 치료를 해야한다.
- 혈청 지방의 농도가 높은 경우(콜레스테롤, 중성지방)
- 감상성 질환을 경험한 환자
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유무를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 이상반응

- 이 약의 치료에 따라 관찰된 가장 빈번한 약물 이상반응은 두통 (30mg : 23.9%, 10mg : 10.8%)이며, 홍반 (30mg : 5.5%, 10mg : 1.7%), 홍조 (30mg : 5.9%, 10mg : 1.6%) 및 중성지방의 증가 (30mg : 35.4%, 10mg : 17.0%), 콜레스테롤증가 (30mg : 27.8%, 10mg : 16.7%), 감상성 지극 호르몬의 감소 (TSH, 30mg : 8.4%, 10mg : 6.0%)와 유리된 T4 감소 (30mg : 10.5%, 10mg : 2.9%) 등이 있다. 이러한 가역적 이상반응은 용량의존적이고 용량 감소에 따라 완화된다.
- 발현부위별 증상은 다음과 같다.

빈도 부위	매우 흔하게 (≥10%)	흔하게 (≥1%, <10%)	흔하지 않게 (≥0.1%, <1%)	드물게 (≥0.01%, <0.1%)	빈도불명
혈액계	변형 혈청지질증가, 대동맥관상 혈소판 증가				
내분비계	T4감소, T4증가				
면역계					아나필락시스반응, 과민반응
정신적	우울증				감정불안, 자살관념
신경계	두통	어지럼(vertigo)	혼란(두개내압증상)		
눈	결막염, 건조안염, 눈물증	시각장애(백막)			아나필락시스
귀	이명				
순환기계	홍조, 고혈압				맥관염
호흡기계			코피		
소화기계	구역, 구강건조, 구토	소화불량			염증성장염
간장	아미노기전아미노산 증가				
피부	피부발진(홍조, 건조, 구순의 습진), 피부염, 홍반, 발진	가려움증, 발진, 피부 박진, 건조증	손톱장애, 손가락의 종창(과민증)		
근골격계	관절통(근육통)	9월경통(자궁, 강직성척추염)			
기타		피로			말초부종
조사	고중성지방혈증, LDL 감소, 고콜레스테롤혈증	혈청 중성지방수치 증가(과민증)			

- 이상반응 발생률이 위약 투여군보다 높지 않다.
- 이 약을 포괄하여 전신 레티노이드 치료시 양성 두개내압 상승이 보고된바 있으며, 일부는 테트라사이클린과 병용시 나타났다. 두통, 구역 및 구토, 시각 이상 및 시신경 유두부종 등의 양성 두개내압 상승의 증후 및 증상이 나타나면 이 약의 복용을 즉시 중단하여야 한다.
- 다음의 이상반응은 이 약의 임상시험에서는 관찰되지 않았으며, 다른 전신 레티노이드에서 보고되었다
가. 당뇨병
나. 색맹 근막테렌즈 비나성
다. 조기골단괴사, 과골형성, 인대와 건의 석회화를 포함한 골변화
라. 각막 혼탁 또는 혼탁을 동반한 각막염
마. 잘 알려진 병력이 없는 환자에서 염증성 관절염
바. 피부 알러지 반응 및 국소 적염 이후 전신 적용한 일부 환자에서 아나필락시스 반응. 시지 및 피부 외에 증증 지방(타박상과 홍반)이 보고된

사. 다형홍반, 스티븐스 존슨증후군, 독성표피괴사증후

- 전신레티노이드 치료는 뼈의 무기질절착 및 석회화과 관련이 있다. 만성수부 습진이 있는 환자를 대상으로 진행된 이 약의 임상연구에 따르면 흔하지 않은 빈도로 척추 및 퇴행성 석회화가 소수의 환자에서 약간 진행되었다(minor progression). 이 변화는 연령에 따른 퇴행성 변화와 일치했으며, 골밀도(DXA) 평가에 따르면 뼈의 무기질 절착에 용량아존성이 나타나지 않았다.
- 정신질환, 특히 우울증, 기분변화 및 자살 충동은 알리트리레티노인을 포함한 레티노이드와 관련이 있다. 정신질환 또는 그 병력이 있는 경우를 제외한 환자에서 CES-D(Center for Epidemiological Studies-Depression)를 사용하여 우울증 모니터링 하였다. 이 약의 복용과 CES-D 점수변화는 상관관계가 없었다.

5. 일반적 주의

- 임상시험결과와 각화증이 주된 증상인 손습진 환자에서 치료효과가 수포증이 주된 증상인 손습진 환자보다 좋았다.
- 햇빛에 더욱 민감하기므로 일광 노출을 최소화 하고, 자외선 차단제를 사용한다.
- 적절한 운동을 삼간다.
- 간조성 각막염의 경우 치료를 중단하면 정상으로 돌아간다. 콘택트렌즈 착용권으로 치료동안 및 치료종료 후 안경을 착용해야 하는 경우도 있다.
- 시력의 이상을 경험한다면, 투여를 중단하고 즉시 의사에게 보고한다.
- 혈액의 동반한 설사를 경험한다면, 투여를 중단하고 즉시 의사에게 보고한다.
- 이 약 및 다른 레티노이드에 치료시 야간에 시력이 감소하는 것이 보고된 바 있다. 어두운 곳에서 운전 및 기계조작을 하는 경우 이러한 문제가 생길 수 있다는 것을 환자에게 사전에 알려야 한다.
- 이 약을 다른사람에게 양도해서는 안되며, 치료 종료 후 잔여 약물은 회수하도록 한다. 또한, 이 약을 복용하고 있거나 복용 중단 1개월 이내의 환자는 임부의 태아가 이 약에 노출되는 위험을 방지하기 위해 헌혈하지 않는다.
- 이 약 투여시 혈청 콜레스테롤과 중성지방 증가 사례가 있다. 혈청 콜레스테롤과 중성지방 수치(공복 값)를 모니터링 한다.
- 이 약이 피부 및 입술을 건조시킬 수 있으므로 환자에게 보습연고나 크림, 입술보호제를 사용하도록 지시한다.
- 이 약 40mg은 14일간 반복투여한 남성의 정액에서 약물이 미량 검출되었으나 축적의 증후는 없었다. 이 약이 여성의 질을 통해 완전히 흡수된다고 하더라도 혈중농도는 무시해도 될 정도이므로 임신한 여성의 태아에 대한 위험은 나타나지 않을 것으로 여겨진다. 비임산연구결과를 토대로 이 약의 투여로 인해 남성의 수태능이 악화될 수 있다.
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체지방률이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 경주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 임신예방프로그램에 따라 의사, 약사 및 환자에게 자료가 제공되며, 각 자료에서는 이 약 투여시 발생할 수 있는 최기형성의 위험에 대한 안내와 함께 관련된 요구사항을 설명하고 있다. 이 약의 처방 및 조제시 의사, 약사는 환자에게 임신 예방프로그램에서 요구하는 사항을 이해하고 다루도록 안내한다. 의사는 최기형성의 위험 및 임신예방프로그램에 명시된 임신예방 조치를 여성과 남성 환자 모두에게 안내하여야 한다. 환자는 임신예방프로그램에서 경고하고 있는 사항에 동의하여야만 이 약을 처방 받을 수 있다.

6. 상호작용

- 비타민 A와의 병용은 비타민 A 과다증상을 악화시킬 수 있으므로 피해야 한다.
- 테트라사이클린류와 병용시 양성 두개내압 상승(가성뇌종양)이 보고되었으므로, 이 약과의 병용투여는 금기이다.
- 호르몬 피임제와 상호작용의 가능성이 있으므로 St. John's wort를 자기 치료하지 않도록 주의한다. 호르몬 피임제와 St. John's wort 병용시 임신이 보고된 바 있다.
- 케토코나졸과 이 약을 병용시 알리트리레티노인의 혈중농도가 상승될 수 있다.
- 성심스타틴과 이 약을 병용시 심바스타틴의 효과가 감소될 수 있다.
- 다른 약물을 복용중이거나 최근에 복용하였다면, 의사 또는 약사에게 통보하여야 한다.

7. 임부, 수유부 및 소아에 대한 투여

- 임신부 및 임신 가능성이 있는 여성에게 금기이다. (경고항 참조)
- 모유유증으로 이행되므로 수유부에 금기이다.
- 만 18세 미만에는 복용을 제한한다.

8. 과량투여시의 처치

- 이 약의 급성 독성(두통, 구토, 안면홍조, 구순염, 복통, 현기증, 조혈계동불증)의 발현빈도는 낮은 부주의한 과량투여에서 비타민 A 과다증(두통, 구역, 구토, 졸음, 과민증 및 기러움)이 나타날 수 있다. 이들 증상은 가역적이다.
- 과량 투여시에는 정액에서의 약물농도가 정상치보다 높을 것으로 예상되므로 남성 환자는 과량투여 후 30일간 근검을 사용하거나, 임신 중 또는 임신 가능성이 있는 여성과의 성생활을 피해야 한다.

9. 적응상의 주의

이 약은 식사와 함께 또는 식사 직후 복용해야 한다. 약을 씹지 않고 물과 함께 삼킨다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 30℃ 이하에서 보관한다.
- 적시광선을 피하여 보관한다.
- 이 약물을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약약품 오염에 의한 사고 발생이나 약약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
- 소지된 사용기한이 경과한 약은 투여하지 않는다.

11. 약약품동등성시험 정보 1)

가. 시험약 및 일반 연질캡슐30밀리그램(알리트리레티노인)[콜마파마]과 대조약 알리트리레티레티노인30밀리그램(알리트리레티노인)[뉴클로스미스클라인]을 2X4교차 시험으로 각 1캡슐씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 41명의 혈청 알리트리레티노인을 측정한 결과, 대조약 C_{max}의 시험대상자 개체 내 변동계수가 40% 이었다. 비교평가 항목치(AUC)를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치치의 90%신뢰구간에 log 0.8에서 log 1.25 이내이며, 비교평가 항목치(C_{max})를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치는 log 0.8에서 log 1.25 이내로서, 변동계수 40%에 해당하는 C_{max}의 로그변환한 평균치치의 90% 신뢰구간에 log 0.7462에서 log 1.3402 이내이므로, 약약품동등성시험기준 제17조제4항에 따라 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분	비교평가항목		참고평가항목		
	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대조약	알리트리레티노인30밀리그램 (뉴클로스미스클라인)	711.4±338.8	261.5±155.5	2.75 (1.00~10.00)	3.05±2.82
시험약	알리트리레티노인30밀리그램 (콜마파마)	693.3±303.0	252.8±146.1	2.75 (1.00~10.00)	9.19±43.90
기준	90% 신뢰구간*		log 0.8954 ~1.0790	log 0.8396 ~1.0713	-
	AUC _{0-∞}	log 0.8~log 1.25			
	C _{max}	log 0.7462 ~log 1.3402 (변동계수** 40%)			
	로그변환한 평균치의 차				
		log 0.9829			
(AUC _{0-∞} , C _{max} , t _{1/2} : 평균값±표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=41)					
AUC _{0-∞} : 투약시간부터 최종혈중농도 정상치(각자의 혈중농도 시간곡선하면적					
C _{max} : 최고혈중농도					
T _{max} : 최고혈중농도 도달시간					
t _{1/2} : 말단 반감기					
* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 치의 90%신뢰구간					
** 대조약 C _{max} 의 시험대상자 개체 내 변동계수(%) = 100 × √[(로그변환한 C _{max} 의 개체내 표준편차/평균치) ²]					

나. 약약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 알리레티노인30밀리그램(알리트리레티노인)[콜마파마]은 대조약 알리레티노인30밀리그램(알리트리레티노인)[콜마파마]과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

1) 이 약은 콜마파마 알리레티노인30밀리그램 및 알리레티노인30밀리그램과 동일한 효력을 사용하여 동일한 제조방법으로 전 과정을 콜마파마에 위탁 제조하였다.

【저장방법】 차광 기밀용기, 30℃ 이하에서 보관

【포장단위】 30캡슐/상자(10캡슐/PTP)X3

【제품문의】 ㈜대우제약 080-200-5724

※ 본 약품은 KGMP(약품 제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 혹은 손상된 약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 약품종동합병제시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후 본 약품의 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.

※ 약품용 부자고 및 피해구제 상담: 한국약약품안전관리원(1644-6223)

※ 피해구제상담(14-3330)

작성(개정)연월일: 2021.04.21

M210401

【제조(외지)】 ㈜대우제약 경기도 남양주시 진접읍 경북대로바람골길 42-151층, 2층

【제 조 자】 콜마파마㈜ 충청북도 제천시 바이오밸리로 93

경기도 남양주시 진접읍 경북대로바람골길 42-151