

고함량 신경비타민 힐스브이파워정

비타민B군 8종

비타민B군 + 비타민C +
r-오리자놀 + CoQ10 + Zn

일반의약품

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【제품명】 힐스브이파워정

【원료약품 및 그 분량】 1정(1328.2 mg) 중

유효성분 :

• 벤포티아민(KP)	50 mg
(티아민염산염으로서 36.15 mg)	
• 아스코르브산(KP)	97 mg
• 리보플라빈(KP)	100 mg
• 니코틴아미드(KP)	100 mg
• 판토텐산칼슘(KP)	108.7 mg
• D-비오틴(USP)	0.1 mg
• 피리독신염산염(KP)	100 mg
• 폴산(KP)	0.1 mg
• 시아노코발라민 1000배산(KP)	100 mg
• 유비데카레논(KP)	5 mg
• 콜린타르타르산염(USP)	100 mg
• 이노시톨(KP)	100 mg
• 감마-오리자놀(KP)	10 mg
• 산화아연(KP)	31.2 mg
(아연으로서 25 mg)	

첨가제 :

• 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 탭솔드갈레(99B411), 히드리스프로필셀룰로오스

【효능·효과】

● 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆ C의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

다음 증상의 완화 : 신경통, 근육, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의피로, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

● 아연의 보급

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신염증질환), 신장질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자 (6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. (1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 고옥살산뇨증 환자(hy-

peroxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태) (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (5) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 감시배당체를 투여 중인 환자 (9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 (10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종 (2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (3) 피리독신을 1일 500 mg~2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (7) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (8) 할랄도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것 (9) 우발적으로 과량복용한 경우 (10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것 (3) 각종 요검시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. (4) 요를 황색으로 변하게 하여

임상검사치에 영향을 줄 수 있다. (5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피할 것. (6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용한다.

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【포장단위】 60정/병, 120정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ※ 이 문안은(2021년 1월 21일)작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 소비자상담실 : 02-521-2308 / www-miraepharmkorea.co.kr Rev.01

【제조·판매원】 미래제약

경기도 안성시 공단2로 104