

이지콜드 노즈

엔질캡슐

일반의약품

Rp

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1.120 mg) 중

유효성분 : 아세트아미노펜(KP)	200.00 mg
수도아페드린염산염(USP)	15.00 mg
D-메틸에페드린염산염(KP)	12.50 mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25 mg

기타 첨가제 : 폴리에틸렌글리콜(40), 정제수, 프로필렌글리콜, 포도분, 젤라틴, 소르비톨스파셀룰로시렌비렌드, 락토스, 홍화황색소

[성상] 미향색(연노랑) 내지 엷은 주황색의 투명한 내용물을 함유한 주황색의 투명한 타원형 엔질캡슐

[용법용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[효능효과] 감기의 증상(여러증상)(코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 옅고 붉은지는 증상), 발열, 두통, 관절염, 근육통)의 완화

[포장단위] 12캡슐/PTP

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[소비자상담실] 031-662-1395

[판매원] ㈜셀로맥스(경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리 D동 710호)

[제조원] ㈜알파바이오(경기도 화성시 함남읍 제약공단4길 35-7)

※ 자세한 약품 정보는 약물관전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물관전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난거나 변질, 변해, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

[사용상의 주의사항]

1. **경고**
① 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
② 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고열물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이 다른 환자들과 다른 징후가 나타날 경우 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
③ 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간 손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.
④ 수도아페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.**
① 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
② 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신을 일으킬 적이 있는 사람
③ 만3개월 미만의 영아(간난이기)
④ MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
3. **이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**
진정(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진해제, 항스타틴제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간난이기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로) 의사와 상의할 것.)
- 2) 만 3개월 미만의 영아(간난이기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우에도 만 2세 미만의 영아(간난이기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(간난이기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 기침(숨통 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간질질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위산의식장질환, 배뇨장애 : 뇨의 통통, 뇨이 침침한 등), 배뇨소변을 늦곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 게양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항고지혈제, 스테로이드 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나거나
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(붓기), 배뇨소변을 늦곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 아나필락시스(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(붓기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 소변이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
② 피부접촉막출혈성(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴피사용해(레이중후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
③ 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 천식
- 5) 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
- 6) 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 정기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 5) 바르비탈계 약물, 심한제 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
7. **저장상의 주의사항**
① 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
② 직사광선을 피하고 일조할 수 있는 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
③ 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.