

다벨리아정 20밀리그램

(테네리글립틴염산염수화물)

전문 의약품

다벨리아정20밀리그램

(테네리글립틴염산염수화물)

Danelia Tab, 20mg

【원료약품 및 성분】 정 중 유효성분 : 테네리글립틴염산염수화물(염기) ----- 26mg (테네리글립틴 염기로서 20mg) 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥타드라이(036540047 필코, 옥수수전분, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 클로이드스(산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨
【성상】 분홍색 원형의 필름코팅정
【효능·효과】 이 약은 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식이요법 및 운동요법 보조제로 투여된다. - 단독요법 - 병용요법
【용법·용량】 단독요법 또는 병용요법 시 이 약의 권장 용량은 1회 1회 20mg 이다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다. 실로날루에이와 병용투여 시에는 저혈당발생의 위험을 감소시키기 위해 실로날루에이의 강량을 고려할 수 있다. 신장기능 환자에서 용법, 용량 조절이 필요하지 않다. 경동맥 중증증상의 진행에 환자에서 용법, 용량 조절이 필요하지 않다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.**
 - 이 약의 주성분 또는 다른 성분에 과민증이 있는 환자
 - 당뇨병성케톤산증, 당뇨병성 혼수 또는 전혼수, 제1형 당뇨병 환자 (수액, 인슐린으로 신속히 혈당을 조절할 필요가 있는 환자)으로 이 약의 투여는 적절하지 않다.)
 - 중증간질증, 수축성 고혈압, 중증의 외상이 있는 환자 (인슐린 주사에 의해 혈당강화가 필요하므로 이 약의 투여는 적절하지 않다.)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.**
 - 중증의 2기/3기 장애가 있는 환자: 중증 장애에 환자에서의 임상경험이 없다.
 - 심부전 : New York Heart Association(NYHA) functional class I~II 의 심부전이 있는 환자에서 투여경험이 제한적이므로, 이들 환자에서는 신중히 사용하여야 한다. New York Heart Association(NYHA) functional class III~IV 환자에서의 임상경험이 없기 때문에 이 약의 사용이 권장되지 않는다.
 - 실로날루에이제 또는 인슐린을 투여중인 환자
 - 다음의 환자 또는 상태 (저혈당을 일으킬 우려가 있다.)
 - 나허수제기능부전 또는 부신기능부전
 - 영양불균상태, 기아상태, 불규칙한 식사습취, 식사섭취량의 부족, 또는 식약상태
 - 격렬한 근육운동을 한 환자
 - 과도한 알콜 섭취자
 - 복부 수술 또는 장폐색의 과거 병력이 있는 환자
 - OT 간격 연장을 일으키기 쉬운 환자(심한 서맥 등의 부정맥 또는 과거병력이 있는 환자, 울혈성 심부전 등의 심장질환)이 있는 환자, 저칼륨혈증 환자 등) : OT 간격 연장 등의 부작용을 유발할 우려가 있으므로, OT 간격 연장은 과거 과격력이 있는 환자(선전성 OT 간격 연장증후군 등), 토르세미드 드 포인트의 과거력이 있는 환자는 투여를 피하는 것이 바람직하다.
 - 해당증 : 일본 및 국내 임상시험에서는 급성해당증이 보고되지 않았으나, 유럽 임상시험에서 급성해당증 1건 및 일본에서 시한 후에 급성 해당증이 보고된 바 있다. 따라서 지속적인 중증 복통 및 구토와 같은 급성 해당 증의 특징적인 증상이 나타날 경우 의사의 전문적인 진단을 받을 것을 환자에게 알려주어야 한다. 만약 투여 시작 후 해당증이 의심될 경우 테네리글립틴과 다른 의식 가능성이 있는 약물의 투여를 중단해야 한다(‘중대한 약물이상반응’ 참조).
- 이상반응**
 - (외국일본) 임상시험결과 및 시판 후 안전성 정보
외국(일본) 임상시험에서 이 약을 4주 이상 투여한 총 1,645명 중 156명(9.5%) 232건의 약물이상반응(임상시험 시지 이상 포함)이 나타났다. 주요 약물이상반응은 저혈당 43명(2.6%), 변비 14명(0.9%) 등이었다.
1) 중대한 약물이상반응
저혈당
다만 당뇨병 약과 병용했을 때 저혈당이 나타나는 경우가 이디글리메티드 병용 시 8.9%, 피오글리타존 병용 시 1.5%, 메글리타이드제 병용시 3.8%, 바구아니드제 병용시 1.1%, α-글루코시다제 제제 병용시 1.3%), 또한 다른 당뇨병 약을 병용하지 않은 경우에도 저혈당증(1.1%)이 나타난 보고가 있다. 저혈당 증상 이 나타날 경우에는 당량을 포함한 지표를 살펴보는 등 적절한 처치를 한다. α-글루코시다제 제제제와 병 용 시에는 포도당이 투여되어야 한다.
장폐색
1) 장폐색이 발생할 경우가 있으므로 충분히 관찰하고, 심한 변비, 복부팽만, 지속적인 복통, 구토 등 이상이 나타날 경우는 투여를 중지하고 적절한 처치를 실시한다.
2)71농 상태(빈도, 설명, 시판 후 안전성 정보)
271농 장애(AST(GOT), ALT(GPT)의 상승 등이 나타날 수가 있으므로 충분히 관찰하고, 의심되는 경우 투 여를 중단하는 등 적절한 처치를 실시한다.
간질성 폐렴(빈도, 설명, 시판 후 안전성 정보)
간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로 기침, 호흡 곤란, 발열, 폐소리의 이상(염발음)등이 관찰되는 경우에는 신속히 폐부 X선, 흉부 CT 등의 적절한 감사를 실시한다. 간질성 폐렴이 의심되는 경우에는 투여를 중단하 고 부신피질 호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 실시한다.
유사천황효빈도, 설명, 시판 후 안전성 정보)
유사천황효이 나타날 수 있으므로 수모나 미란 등이 관찰되는 경우에는 피부과 전문의와 상담하고 투여를 중단하는 등 적절한 처치를 실시한다.
급성 해당염(빈도, 설명, 시판 후 안전성 정보)
급성 해당염이 발생할 수 있다. 환자는 신중하게 관찰되어야하며 지속적인 중증 복통 및 구토와 같은 이상이 관찰되는 경우 이 약의 투여를 중단하고 적절한 치료 방법을 취해야 한다.(‘신중투여’ 항 참조)
2) 기타 약물이상반응
4) 기타 약물이상반응
이 약은 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
표 1. 기타 약물이상반응

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	
신장·비뇨기계	단백뇨, 케톤뇨, 단백뇨		
피부	습진, 발진, 가려움, 알레르기성 피부염		관절통
근골격계			
기타	CK(CPK) 상승, 혈청 빌루빈도 상승, 간매김, 말레르 기상 비염, 혈청 오산 상승		말초 부종

빈도종류	0.1~1% 미만 (흔하지 않게)	0.1% 미만 (드물게)	빈도불명
정신·신경계			어지러움
소화기	변비, 복부팽만, 복부불쾌감, 메스꺼움, 복통, 고창, 구 내염, 위 불림, 결장 불림, 심야자각 깨짐, 위트루성식도염, 설사, 식욕감퇴, 가려움질 이상, 리파아제 이상		
간	AST(GOT) 상승, ALT(GPT) 상승, GGT 상승	ALP 상승	