당신의 피로 멘토

멘토비M 엠정

일반의약품

[성분・함량] 이 약 1정 중

• **유효성분:**

비스벤티아민(KP)(티아민염산염으로서 13.125 mg)	15 mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 61.46mg)	85 mg
리보플라빈부티레이트(KP)	12 mg
니코틴산아미드(KP)	50 mg
판토텐산칼슘(KP)	100 mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	5 mg
폴산(KP)	0.5 mg
시아노코발라민(KP)	0.75 mg
레티놀아세테이트(USP)(비타민A로서 3,000 IU)	6 mg
농축콜레칼시페롤(EP)(콜레칼시페롤으로서 1,000 IU)	10 mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)(비타민E로서 20 IU)	40 mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 60.3mg)	100 mg
산화아연(KP)(아연으로서 24.1 mg)	30 mg
우르소데옥시콜산(KP)	15 mg
콜린타르타르산염(DAB)	100 mg
이노시톨(KP)	100 mg

• **기타 첨가제:** 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소, 탭쉴드분홍색(99P664), 탭쉴드흰색(19W623), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 연한분홍색의 장방형 필름코팅정

[효능・효과]

1. 다음 경우의 비타민 A, D, E, B_1, B_2, B_6 의 보급
   - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
2. **이 약에 함유된 비타민 등의 효능・효과는 다음과 같다.**
   - ■ 비타민B_1(벤포티아민) :
     - • 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
     - – 각기
     - – 눈의 피로
   - ■ 비타민B_2(리보플라빈부티레이트) :
     - • 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
   - ■ 비타민A(레티놀아세테이트) :
     - – 눈의 건조감의 완화
     - – 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
   - ■ 비타민D(농축콜레칼시페롤과립) :
     - – 뼈, 이의 발육불량 – 구루병의 예방
3. **아연의 보급**

[용법・용량] 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정

[사용상의 주의사항]

1. 경고
임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

(2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(3) 만 12개월 미만의 젖먹이

(4) 신장결석 환자

(5) 심한 증상의 신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

(2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

(3) 심장·순환기계기능 장애 환자

(4) 신장장애 환자

(5) 저단백혈증 환자

(6) 강심배당체를 투여 중인 환자

(7) 신장결석 병력이 있는 환자

(8) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

(4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.

(5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B_{12}를 1일 10 ㎍ 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

(6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

(7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

(8) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

(9) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈엉성증) 위험을 높일 수 있다.

(10) 우발적으로 과량복용 한 경우

(11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법・용량을 잘 지킬 것.

(2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.

(3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 외부포장참조

[포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

※ 본 의약품은 KGMP (의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com)나 전화(080-497-5273)로 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

• 작성일자 : 2021. 04. 05

V.0000

[판매원]

Daewon 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 24

[제조자]

한국코러스(주)

충청북도 제천시 강저로 30