

위에서 한번! 복장에서 또 한번! 속편한 소화제!

제일 속엔자임 이중정

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정(592.6밀리그램) 중

- 판크레아틴(KP) (전분당화력 378단위이상, 단백소화력 5112단위이상, 지방소화력 155단위이상) 40mg
- 우르소데옥시콜산(JP) 10mg
- 시메티콘(USP) 30mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40알루미늄레이크
- 동물유래성분 : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴아즈하인색(93018509), 오파드라이하인색(85F18422), 적색산화철, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성 상] 연한 빨간색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상의 성인은 1회 1~2정 1일 3회 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지 할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10 정/상자(10정/PTP), 20 정/상자(10정/PTP x2), 90 정/상자(10정/PTP x9), 100 정/병, 500 정/병

※ 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오나 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.
 소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화: 080-332-0002)로 연락바랍니다.
 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223) 혹은 의약품 피해구제 전용 상담번호(14-3330)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
 설명서작성변월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilhs.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

[제조업체 및 판매원]



제일 헬스사이언스 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

[제조원]

(주)한국파비스 제약 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

설명서 작성변월일 2021.03.03

1EM-B-H000-W3-01