

글루비타정

[원료약품의 분량] 1정 중

■유효성분

푸르셀티아민(KP).....	50 mg
피리독신염산염(KP).....	33.33 mg
시아노코발라민 100배산(USP).....	100mg
(시아노코발라민으로서1000마이크로그램)	
폴산(KP).....	0.33 mg

■첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

■기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(88A620084), 포비돈, 크로스포비돈

[성상] 노란색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₆의 보급
- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 B (푸르셀티아민)의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인: 1일 1회 1정을 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 뉘은 변, 설사, 구내염(입안염)
2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
4) 우발적으로 과량복용 한 경우
5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
2) 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 100정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)

[최종 개정연월일] 2021.03.04

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한 이 지났거나 유통기한 중 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합보시시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

dalim (주)다림바이오텍

[제조사] (주)다림바이오텍 강원도 원주시 지정면 신평로 33

대표전화: 02) 335-1656 / 소비자상담실: 080) 333-1656(수신자부담) / 공장 및 연구소: 033) 738-4600

한국의약품안전관리원: 1644-6223, 14-3330