

리피듀엥정 10/10밀리그램

(에제티미브 / 아토르바스타틴칼슘삼수화물)

LIPIDUET Tab. 10/10mg

【원료약품 및 분량】 1정(309.0 밀리그램) 중

유효성분: 아토르바스타틴칼슘삼수화물(염류)·····10.85mg(아토르바스타틴으로서 10mg)

에제티미브(염류)·····10.0mg

첨가제 (동물용): 유당·수화물·소·우유

기타 첨가제: 폴리알황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨세, 오파드라아황산염

(20A680000), 콜로이드성산화규소, 크로스카르멜로소스나트륨, 탄산칼슘, 포비돈K30, 폴리스크비트80, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】

이 약은 또는 연한 노란색으로 이루어진 양면이 불룩한 캡슐모양의 필름코팅정

【효능·효과】

원발성 고콜레스테롤혈증

원발성 고콜레스테롤혈증(이형집합 가축형 및 비가축형) 또는 혼합형 이상지질혈증 환자의 상승된 총콜레스테롤(total-C), LDL-콜레스테롤(LDL-C), apo B 단백질(apo B), 트리글리세리드(TG) 및 non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤(HDL-C)을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제로서 이 약을 투여한다.

동형집합 가축형 고콜레스테롤혈증(HoFH)

동형집합 가축형 고콜레스테롤혈증(HoFH) 환자의 상승된 총 콜레스테롤 및 LDL-콜레스테롤을 감소시키기 위한 다른 지질저하 치료에(LDL-Apheresis)의 보조제로서, 또는 다른 지질저하 치료 가 유용하지 않은 경우 이 약을 투여한다. 아토르바스타틴이 심혈관 이환을 및 사망률을 감소시키는 효과보다 이 약이 더 큰 유익성을 나타내는 것은 불확실했다.

이 약은 이상지질혈증의 Fredrickson type I, III, IV 및 E에 대해서는 연구되지 않았다. 고콜레스테롤혈증에 기인한 동맥경화성 혈관 질환의 위험성이 증가한 환자에게 지질조절 약물을 투여할 때에는 많은 위험 인자를 고려해야 한다. 지질조절약물은 적절한 식이요법(포화지방 및 콜레스테롤 제한을 포함)과 함께 사용하고, 식이요법이 다른 비약물학적 조치에 대한 반응이 불충분한 경우에 사용해야 한다(사용상의 주의사항 참조). 이상지질혈증 치료지침(NCEP ATP III Guideline 요약표)항 참조. 이 약투여에 앞서 이상지질혈증의 다른 이차적 원인(예를 들면, 당뇨, 갑상선기능저하증, 폐쇄성 간질환, 만성 신장신, LDL-콜레스테롤을 증가시키는 약물 및 HDL-콜레스테롤을 감소시키는 약물(progestin, anabolic steroid, 및 corticosteroid)을 확인하여야 하며, 필요한 경우 이차적 원인을 치료해야 한다. 지질 검사시에는 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, HDL-콜레스테롤 및 트리글리세리드를 포함하여 한다. 트리글리세리드의 수치가 400mg/dL 이상(4.5mmol/L 이상)인 경우에는 초전실보리 LDL-콜레스테롤 농도를 측정해야 한다. 급성 관상동맥 사고로 입원할 경우에는 입원 시 혹은 입원 후 24시간 이내에 지질을 측정해야 한다. 환자의 퇴원 전 혹은 퇴원 시에 LDL-지질치료를 시작하는데 있어 이 측정치가 참고가 될 수 있다.

【용법·용량】

이 약은 식사와 관계없이 1일 1회 투여한다.

이 약을 투여하기 전 또는 투여 중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤 저하식을 지속적으로 해야 한다.

이 약의 투여량은 환자의 LDL-콜레스테롤의 기저치, 권징되는 치료목표치 및 환자의 반응에 따라 조절되어야 한다.

환발성 고콜레스테롤혈증

이 약의 용량범위는 1일 10/10mg~10/80mg이다. 초효율량으로 1일 10/10mg 또는 10/20mg이 권장된다. LDL-콜레스테롤을 감소 더 많이(55% 이상) 요구되는 환자의 경우, 초효율량으로 1일 10/40mg이 권장된다. 이 약의 투여를 시작할 후 또는 용량을 조정할 후에는 2주 이상의 간격을 두고 혈중 지질 수치를 확인한 후 그에 따라 용량을 조절한다.

동형집합 가축형 고콜레스테롤혈증

동형집합 가축형 고콜레스테롤혈증 환자의 권장 용량은 1일 10/40mg 또는 10/80mg이다. 이 약은 다른 지질저하치료에(LDL-Apheresis)의 보조제로서 또는 다른 지질저하치료가 유용하지 않는 경우 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

아토르바스타틴 및 동일 계열의 다른 약물에서 미오글로빈뇨에 의한 이차적인 급성 신부전을 동반하는 횡문근융해가 드물게 보고되었다. 따라서 급성의 심각한 근육병증을 나타내는 환자 또는 횡문근융해에 의한 이차적으로 신부전 발생될 수 있는 위험 요소(예: 중증 급성 감염, 저혈압, 쇼크 외과수술, 외상, 중독, 탈수, 내분비 및 전신혈 장애, 조절되지 않는 발작을 가진 환자)는 이 약의 치료를 일시적으로 보류하거나 또는 중지해야 한다. (5. 일반적 주의 참조)

국내에서 재조사된 시판 후 조사 결과

12주 임상시험을 완료한 후, 정확한 환자들을 대조 추가로 48주간 이 약의 주성분인 에제티미브와 아토르바스타틴을 병용투여(10/10 ~ 10/80mg)하거나 아토르바스타틴(10-80mg)만을 투여하였다. 에제티미브와 아토르바스타틴의 장기간 병용 투여 시 전반체적인 안전성 양상은 아토르바스타틴 단일 투여와 유사하였다.

<재조사에 국내 시판 후 조사 결과>
국내에서 재조사된 시판 후 조사 결과 643명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 1.9%(7/643명, 중 130건)로 보고되었다. 이 중 인과관계를 배제할 수 있는 중대한 약물이상반응 및 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.

발현빈도	기관계	중대한 약물이상반응 1.56%(10/643명, 12건)	예상하지 못한 약물이상반응 1.87%(12/643명, 15건)
흔하지 않게 (0.1~1% 미만)	신장계 장애	두개 내 동맥류	두개 내 동맥류, 하혈/뇌중출근
	정신 장애	우울증	
	감염 및 침습	외과균성 치아농양,전장 신염	치아 농양, 전장 신염
	심장 장애	사맥	사맥
	혈관 장애	-	저혈압
흔하지 않게 (0.1~1% 미만)	혈액 및 림프계 장애	빈혈	
	전신 장애	탈장	탈장
	대사 및 영양계 장애	고칼륨혈증	비타민D결핍
	위장관 장애	-	위장증,심미저조증,심미지장증
	간담도 장애	황달	-
	생식기 및 유방 장애	발기 기능 장애	유방 통증
	피부 및 피하조직 장애	피부 주괴	관심 손실됨, 피부주괴
			감상신경

아래에 명시된 정보는 아토르바스타틴 및 에제티미브 개개의 성분에 대한 임상시험 및 시판 후 조사된 결과에 근거한 것이다.

0 아토르바스타틴
1) 아토르바스타틴에 대한 임상시험에서 투여기간의 중앙값은 53주였으며 16,068명의 환자가 아토르바스타틴 투여군 8,755명과 대조 투여군 7,313명 간 비교와 상관없이 이상반응으로 인해 치료를 중단한 환자는 아토르바스타틴 투여군에서 3.5%, 대조 투여군에서 4.0%였다.

2) 이상사례의 시판 후 조사에 기초하여 어떤 이상반응을 대조군과 이상반응에 대한 발현빈도는 다음과 같다: 매우 자주(≥1/10), 자주(≥1/100, <1/10), 때때로(≥1/1,000, <1/100), 드물게(≥1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게(<1/10,000)

(1) 정신: 때때로 무관심, 전장, 가슴통증, 발작, 공포, 발열
(2) 간: 자주, 주괴
(3) 감염: 자주, 주괴
(4) 심장: 때때로 저혈압, 체중증가, 심음부정
(5) 소화기: 자주, 주괴, 설사, 복부팽만, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(6) 근육계: 자주, 주괴, 근육통, 코피
(7) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(8) 대장: 자주, 주괴
(9) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(10) 근육계: 자주, 주괴
(11) 간담도: 자주, 주괴
(12) 피부: 자주, 주괴
(13) 생식기: 자주, 주괴
(14) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(15) 소화기: 자주, 주괴
(16) 근육계: 자주, 주괴
(17) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(18) 대장: 자주, 주괴
(19) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(20) 근육계: 자주, 주괴
(21) 간담도: 자주, 주괴
(22) 피부: 자주, 주괴
(23) 생식기: 자주, 주괴
(24) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(25) 소화기: 자주, 주괴
(26) 근육계: 자주, 주괴
(27) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(28) 대장: 자주, 주괴
(29) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(30) 근육계: 자주, 주괴
(31) 간담도: 자주, 주괴
(32) 피부: 자주, 주괴
(33) 생식기: 자주, 주괴
(34) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(35) 소화기: 자주, 주괴
(36) 근육계: 자주, 주괴
(37) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(38) 대장: 자주, 주괴
(39) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(40) 근육계: 자주, 주괴
(41) 간담도: 자주, 주괴
(42) 피부: 자주, 주괴
(43) 생식기: 자주, 주괴
(44) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(45) 소화기: 자주, 주괴
(46) 근육계: 자주, 주괴
(47) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(48) 대장: 자주, 주괴
(49) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(50) 근육계: 자주, 주괴
(51) 간담도: 자주, 주괴
(52) 피부: 자주, 주괴
(53) 생식기: 자주, 주괴
(54) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(55) 소화기: 자주, 주괴
(56) 근육계: 자주, 주괴
(57) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(58) 대장: 자주, 주괴
(59) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(60) 근육계: 자주, 주괴
(61) 간담도: 자주, 주괴
(62) 피부: 자주, 주괴
(63) 생식기: 자주, 주괴
(64) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(65) 소화기: 자주, 주괴
(66) 근육계: 자주, 주괴
(67) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(68) 대장: 자주, 주괴
(69) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(70) 근육계: 자주, 주괴
(71) 간담도: 자주, 주괴
(72) 피부: 자주, 주괴
(73) 생식기: 자주, 주괴
(74) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(75) 소화기: 자주, 주괴
(76) 근육계: 자주, 주괴
(77) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(78) 대장: 자주, 주괴
(79) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(80) 근육계: 자주, 주괴
(81) 간담도: 자주, 주괴
(82) 피부: 자주, 주괴
(83) 생식기: 자주, 주괴
(84) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(85) 소화기: 자주, 주괴
(86) 근육계: 자주, 주괴
(87) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(88) 대장: 자주, 주괴
(89) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(90) 근육계: 자주, 주괴
(91) 간담도: 자주, 주괴
(92) 피부: 자주, 주괴
(93) 생식기: 자주, 주괴
(94) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(95) 소화기: 자주, 주괴
(96) 근육계: 자주, 주괴
(97) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(98) 대장: 자주, 주괴
(99) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(100) 근육계: 자주, 주괴
(101) 간담도: 자주, 주괴
(102) 피부: 자주, 주괴
(103) 생식기: 자주, 주괴
(104) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(105) 소화기: 자주, 주괴
(106) 근육계: 자주, 주괴
(107) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(108) 대장: 자주, 주괴
(109) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(110) 근육계: 자주, 주괴
(111) 간담도: 자주, 주괴
(112) 피부: 자주, 주괴
(113) 생식기: 자주, 주괴
(114) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(115) 소화기: 자주, 주괴
(116) 근육계: 자주, 주괴
(117) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(118) 대장: 자주, 주괴
(119) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(120) 근육계: 자주, 주괴
(121) 간담도: 자주, 주괴
(122) 피부: 자주, 주괴
(123) 생식기: 자주, 주괴
(124) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(125) 소화기: 자주, 주괴
(126) 근육계: 자주, 주괴
(127) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(128) 대장: 자주, 주괴
(129) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(130) 근육계: 자주, 주괴
(131) 간담도: 자주, 주괴
(132) 피부: 자주, 주괴
(133) 생식기: 자주, 주괴
(134) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(135) 소화기: 자주, 주괴
(136) 근육계: 자주, 주괴
(137) 정신: 때때로 불쾌한 반응

(138) 대장: 자주, 주괴
(139) 비뇨: 때때로 저혈당, 체중증가, 신음부정
(140) 근육계: 자주, 주괴
(141) 간담도: 자주, 주괴
(142) 피부: 자주, 주괴
(143) 생식기: 자주, 주괴
(144) 위장: 때때로 위장장애, 구역, 설사, 때때로 복통, 구드, 트림, 헛장염
(145) 소화기: 자주, 주괴
(146) 근육계: 자주, 주괴
(147) 정신: 때때로 불쾌한 반응

6) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(1) 피부: 발진, 두드러기, 태선, 피부염, 탈모

(2) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(3) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(4) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(5) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(6) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(7) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(8) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(9) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(10) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(11) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(12) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(13) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(14) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(15) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(16) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(17) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(18) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(19) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(20) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(21) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(22) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(23) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(24) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(25) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(26) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(27) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(28) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(29) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(30) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(31) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(32) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(33) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(34) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(35) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(36) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(37) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

(38) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.

상기도 감염	10.8	13.0	13.6	11.8
신장계				
관혈통	2.3	3.8	4.3	3.4
요통	3.5	3.4	3.7	
근육통	4.6	5.0	4.1	4.5

* HMG-CoA 환원효소 억제제와 동시에 에제티미브 투여를 시작한 4명의 위약대조 병용투여 임상시험을 포함한다.

* 스타틴계 약물 = 모든 HMG-CoA 환원효소 억제제적 모든 약물

3) 페노피brate와 병용투여
이 임상시험은 12주까지 혼합형 이상지질혈증 환자 625명, 대조군 이중맹검 위약대조 임상시험을 대상으로 실시하였다. 이 시험은 드물게 발생하는 이상반응을 투여군 간에 비교하기 위해 설계되지 않았다. 혈청 아미노전이효소의 임상적으로 중요한 상승(정상 상한치의 3배 이상, 지속적인 상승(9.8% C)은 투여 대조군을 포함하였을 때, 페노피brate는 단독투여군보다 4.5%(1.9, 8.8)였다.

4) 페노피brate와 페노피brate의 병용투여군에서 2.7%(1.2, 5.4)였다. 당장작용제의 발현율은 페노피brate는 단독투여군보다 0.6%(0.0, 3.7%)로, 에제티미브와 페노피brate의 병용투여군보다 1.7%(0.6, 4.0%)였다. 이 시험기간 투여군에서, 크레아티닌포스포키네제(creatine phosphokinase, CK)가 정상상한치의 10배 이상 상승한 경우도 없었다.

4)에제티미브 단독투여군(n=1691), 에제티미브와 스타틴계 약물 병용투여군(n=1675) 또는 에제티미브와 페노피brate의 병용투여군(n=185)에서 약물과 관련하여 흔하게 보고된 이상반응은 다음과 같다 (≥1/100, <1/10).

* 에제티미브 단독투여군: 두통, 복통, 설사

* 에제티미브와 스타틴계 약물 병용투여군: 두통, 피로, 복통, 변비, 설사, 고창, 오심,

AST 증가, ALT 증가, 근육통

* 에제티미브와 페노피brate의 병용투여군: 복통

5) 시판 후 이상반응

다음 이상반응이 인과관계와 평가와 관계없이 에제티미브를 투여한 환자 2% 이상에서 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

<표> 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

<표> 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

6) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

7) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

8) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

9) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

10) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

11) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

12) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

13) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

14) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

15) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

16) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

17) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

18) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

19) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

20) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

21) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다.

22) 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반응이 보고되었다. 위와 명시되지 않은 것으로서 시판 후 다음과 같은 이상반

