

유스타정 100밀리그램, 50밀리그램

(시타글립틴염산염수화물)

전문의약품

【**원료약품 및 그 분량**】

· 유스타정100밀리그램：1정(416.00 밀리그램) 중 유효성분：시타글립틴염산수화물(별구)…113.40mg(시타글립틴으로서 100mg) 기타첨가제：무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨세, 오파드라이®비이저(85F17436), 크로스카멜로오스나트륨, 푸마르산스테이릴나트륨

· 유스타정50밀리그램：1정(208.00 밀리그램) 중 유효성분：시타글립틴염산염수화물(별구)…56.70mg(시타글립틴으로서 50mg) 기타첨가제：무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨세, 오파드라이®비이저비이저(85F17498), 크로스카멜로오스나트륨, 푸마르산스테이릴나트륨

【**용법**】

· 유스타정100밀리그램：밝은 갈색으로 원형의 양면이 불룩한 필름코팅정제

· 유스타정50밀리그램：밝은 실색색으로 원형의 양면이 불룩한 필름코팅정제

- 【**효능·효과**】
- 아연 제2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.
 - 이 약은 단독요법으로 투여한다.
 - 이전 당뇨병 환자에서 혈당을 받은 경험이 없으며 단독요법으로 충분한 혈당조절이 어려운 경우 메트포르민과 병용투여한다.
 - 실포닐우레아 또는 메트포르민 또는 차이졸리딘디온 또는 인슐린 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우 이 약을 병용투여한다.
 - 실포닐우레아 및 메트포르민 병용요법, 또는 차이졸리딘디온 및 메트포르민 병용요법, 또는 인슐린 및 메트포르민 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우, 이 약을 병용투여한다.

【**용법·용량**】

이 약은 단독요법 또는 병용요법 시 1일 1회 100 mg를 투여하여 1일 최대용량은 100 mg이다. 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있다. 실포닐우레아 또는 인슐린과 병용 투여시에는 실포닐우레아 또는 인슐린 유무에 따라 저혈당발생의 위험을 감소시키기 위해 실포닐우레아 또는 인슐린의 감소를 고려할 수 있다 (사용상의 주의사항 5. 일반적 주의 항 참조). 신장애 환자

- 신장기능에 따른 용량조정이 필요하므로 이 약 투여 전 및 투여 후 주기적으로 신장기능의 평가가 필요하다.
- 중증의 신장애환자(사구체여과율[eGFR] ≥ 60 mL/min/1.73 m² 및 < 90 mL/min/1.73 m²)에서는 용량조정이 필요하지 않다.
 - 중증도의 신장애환자(사구체여과율[eGFR] ≥ 45 mL/min/1.73 m² 및 < 60 mL/min/1.73 m²)에서는 용량조정이 필요하지 않다.
 - 중증도의 신장애환자(사구체여과율[eGFR] ≥ 30 mL/min/1.73 m² 및 < 45 mL/min/1.73 m²)에서는 1일 1회 50 mg를 투여한다.
 - 중증의 신장애환자(사구체여과율[eGFR] ≥ 15 mL/min/1.73 m² 및 < 30 mL/min/1.73 m²) 또는 혈액투석이나 복막투석을 요하는 말기신장애환자(ESRD) (사구체여과율[eGFR] < 15 mL/min/1.73 m²)에서는 1일 1회 25 mg를 투여한다. 이 약은 투석 시점과 관계없이 투여할 수 있다.

【**사용상의 주의사항**】

1. **경고**

1) 과민반응

시판 후 이 약을 투여한 환자에서 중증의 과민반응이 보고되었으며, 이 반응은 아나필락시스, 혈관부종 및 스티븐스-존슨증후군을 포함한 비극성 피부질환을 포함한다. 이것은 불특정 다수의 인구집단으로부터 자발적으로 보고되었기 때문에 발생 빈도를 신뢰성 있게 예측하거나 약물 노출과의 인과관계를 확립 하는 것은 일반적으로 가능하지 않다. 이 반응의 시작은 약물 치료 개시 후 첫 3개월 이내에 발생하였으며, 첫 용량 이후에 보고된 것도 있다. 만약 과민 반응이 의심되는 경우, 이 약을 중단하고 적절한 의료적 처치를 평가하고 다른 당뇨병 치료요법을 실시한다. (2 다음 환자에는 투여하지 말 것 및 4 이상 반응, 2) 시판 후 이상반응 항 참조).

2) **해장염**

시타글립틴을 투여한 환자에서 치명적/비치명적 출혈성 또는 과다성 해장염을 포함하는 급성 해장염이 보고되었다 (4. 이상반응 항 참조). 이 약 투여 시작 후 해장염 증상이 나타나지 시 주의깊게 관찰하여야 한다. 만약 해장염이 의심 될 경우 이 약 및 다른 의식 가능성이 있는 약물의 투여를 중단해야 한다.

2. **다음 환자에는 투여하지 말 것**

1) 제1형 당뇨병 또는 당뇨병성 케톤산증 환자

이 약이나 이 약의 성분에 대하여 아나필락시스 또는 혈관부종과 같은 과민성이 알려진 환자 (1. 경고 항 참조)

3. **다음 환자에는 신중히 투여하지 할 것**

1) 신장애환자：이 약은 신장으로 배설된다. 정상 신기능을 가진 환자에서와 유사 한 혈중농도에 도달하기 위해서 사구체여과율(eGFR) < 45 mL/min/1.73 m²를 가진 환자 및 혈액투석 또는 복막투석을 요하는 말기 신장애(ESRD)환자에서는 사용량이 권장된다. (용법용량, 신장애 항 참조).

4. **이상반응**

1) 임상시험

임상시험은 광범위하고 다양한 조건 하에서 실시되므로 임상시험에서 관찰된 이상 반응 발생률은 다른 약물의 임상시험에서의 비율과 직접적으로 비교될 수 없으며, 실제 사용환경 하에서 관찰된 비율을 반영할 수 없다. 이 약의 임상시험에서 이 약을 단독요법 또는 병용요법(메트포르민 또는 피오글리타존 또는 로시글리타존 및 메트포르민으로 투여한 경우 이상반응 및 저혈당의 발생빈도는 위약에서 보고된 것과 전반적으로 유사하였다. 이상반응에 의해 치료를 중단한 경우도 위약군과 유사하였다. 글리메피리드 또는 글리메피리드 및 메트포르민 병용요법시 이 약 투여군의 이상반응 발생빈도가 위약군보다 높았다 (표 3). 이는 이 약 투여 군에서 저혈당 발생빈도가 높았던 것에 일부 기인한다. 이상반응에 의한 치료종단은 위약군과 유사하였다. 18주 및 24주간 진행된 2건의 위약대조 단독요법 연구에 매일 이 약 100 mg 및 200 mg, 위약을 투여한 군이 포함되었다. 5건의 위약대조 추가 병용요법 연구는 각각 메트포르민, 피오글리타존, 로시글리타존 및 메트포르민, 글리메피리드 (±메트포르민), 또는 인슐린 (±메트포르민)의 안정된 용량에 이 약 100 mg 또는 위약을 매일 병용투여하였다. 이 임상시험 들에서 저혈당을 제외한 인과관계 평가와 관계없이 이 약 100 mg을 18주간 매일 복용한 환자 중 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상 반응은 표 1과 같다. 저혈당의 발생빈도는 표 3과 같다.

표 1. 이 약 단독요법 또는 병용요법(피오글리타존 또는 로시글리타존 및 메트포르민 또는 글리메피리드 (±메트포르민)과)의 위약대조 임상시험: 인과관계 평가와 관계 없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 저혈당을 제외한 이상반응

이상반응	환자수 (%)		
단독요법 (18 또는 24주)	이 약 100 mg (443명)	위약 (363명)	
비인두염	23 (5.2)	12 (3.3)	
피오글리타존과의 병용요법 (24주)	이 약 100 mg + 피오글리타존 (175명)	위약 + 피오글리타존 (178명)	
상기도감염	11 (6.3)	6 (3.4)	
두통	9 (5.1)	7 (3.9)	
로시글리타존 및 메트포르민과의 병용요법 (18주)	이 약 100 mg + 로시글리타존 + 메트포르민 (181명)	위약 + 로시글리타존 + 메트포르민 (97명)	
상기도감염	10 (5.5)	5 (5.2)	
비인두염	11 (6.1)	4 (4.1)	
글리메피리드 (±메트포르민)의 병용요법 (24주)	이 약 100 mg + 글리메피리드 (± 메트포르민) (222명)	위약 + 글리메피리드 (± 메트포르민) (219명)	
비인두염	14 (6.3)	10 (4.6)	
두통	13 (5.9)	5 (2.3)	

+ ITT (Intent-to-treat) 피험자군

24주간 이 약과 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계 없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 없었다. 24주간 이 약과 안정된 용량의 인슐린 (±메트포르민)을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 저혈당을 제외한 이상반응은 없었다 (저혈당을 표 3 참조). 또 다른 24 주간 인슐린 강화 기간 (±메트포르민) 동안 이 약을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 실시였다.(이 약 5.2%; 위약 3.3%) 54주간 이 약과 로시글리타존 및 메트포르민을 추가 병용투여한 환자에서 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은: 상기도감염 (이 약 15.5%, 위약 6.2%), 비인두염 (11.0%, 9.3%), 말초부종 (8.3%, 5.2%) 및 두통 (5.5%, 4.1%) 이었다. 2개의 단독요법 임상시험, 메트포르민 추가 병용요법 임상시험 및 피오글리타존 추가 병용요법 임상시험의 종합분석 결과, 이 약을 투여한 환자에서 특정 위양과 이상반응의 발생률은 다음과 같다: 복통(이 약 100 mg 2.3%, 위약 2.1%), 구역(이 약 100 mg 1.4%, 위약 0.6%), 설사(이 약 100 mg 3.0%, 위약 2.3%) 24주간 실시된 위약 대조 요인설계 임상시험(factorial trial)에서 이 약과 메트포르민을 초기 병용투여 시 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되거나 위약보다 빈번히 보고된 이상반응은 표 2와 같다.

표 2. 이 약과 메트포르민의 초기병용요법: 인과관계 평가와 관계없이 5% 이상의 빈도로 보고되고 이 약 단독투여, 메트포르민 단독투여, 위약보다 빈번히 보고된 이상반응

	환자수(%)			
이상반응	위약 (176명)	이 약 100 mg 1일 1회 (179명)	메트포르민 500 mg 또는 1000 mg 1일 2회* (364명)	이 약 50 mg 씩 1회 + 메트포르민 500 mg 또는 1000 mg씩 1일 2회(372명)
상기도감염	9 (5.1)	8 (4.5)	19 (5.2)	23 (6.2)
두통	5 (2.8)	2 (1.1)	14 (3.8)	22 (5.9)

+ ITT (Intent to treat) 피험자군

* 메트포르민 저용량, 고용량을 투여한 환자의 통합자료

이 약의 투여로 혈액장후 또는 ECG/Qtc 간격 포함하여 임상적으로 유의한 변화는 관찰되지 않았다.

해장염

시타글립틴 100 mg/일 군(N=5429) 또는 이에 상응하는 대조군(혈당대조약 또는 위약)(N=4817)에 무작위 배정된 10,246명 환자에 대한 19개 이중맹검 임상시험의 결과를 취합 분석하였을 때, 각 군에서의 급성 해장염의 발생률은 100 환자-년수(patient-years)당 0.11이었다 (시타글립틴 군에서는 4708 환자-년수 중 4명의 환자에서, 대조군에서는 3942 환자-년수 중 4명의 환자에서 보고됨). TECOS 실험관계 안전성 임상시험에서, 급성 해장염의 발생률은 시타 글립틴 군에서 100 환자-년수(patient-years)당 0.11(23/7,332명, 25건), 위약 군에서 100 환자-년수(patient-years)당 0.06(12/7,339명, 17건)으로 보고되었다. (1. 경고, 2)해장염 항 참조. TECOS 실험관계 안전성 임상시험(항 참조)

TECOS 실험관계 안전성 임상시험 (TECOS: Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) 이 약의 실험관계 안전성 임상시험의 ITT(Intent-to-treat)군에 이 약을 매일 100 mg (또는 기저상태에서 eGFR ≥ 30 및 < 50 mL/min/1.73 m²인 경우 매일 50 mg)를 투여받은 환자 7,332명과 위약을 투여받은 환자 7,339명이 포함되었다. 이 임상시험에서 이 약 또는 위약은 당화혈색소(HbA1c) 및 실험관계(CV) 위험 인자와 관련된 각각의 일반적인 치료에 추가로 투여됨을 받았다. 이 약 투여 시 주요한 실험관계 질환이나 심부전으로 인한 입원 위험을 높이지 않았다(10. 기타항 참조). 보고된 중대한 이상반응의 발생빈도는 이 약 투여군에서 12.7%, 위약 투여군에서 12.4%로 유사하였다. 중증의 저혈당의 발생빈도는 이 약 투여군에서 2.2%(160명, 100 환자-년수(patient-years)당 0.78), 위약 투여군에서 1.9%(143명, 100 환자-년수(patient-years)당 0.70)로 보고되었다. 인슐린 및/또는 실포닐우레아를 투여 받은 환자들 중, 중증의 저혈당 발생빈도는 이 약 투여군에서 2.7%(138/5,021명), 위약 투여군에서 2.5%(125/4,931명)였고, 인슐린 및/또는 실포닐우레아를 투여하지 않은 환자들 중, 중증의 저혈당 발생 빈도는 이 약 투여군에서 1.0%(22/2,311명), 위약 투여군에서 0.7%(18/2,408명)였다. 확진된 급성 해장염의 발생빈도는 이 약 투여군에서 0.3%, 위약 투여군에서 0.2%이었다.

저혈당

모든 연구 (9개)에서 저혈당 이상반응은 모든 증상이었던 저혈당 보고에 근거하 였다. 혈당측정이 수 수반되었던 것은 아니었고, 대부분의 저혈당 보고 (74%)는 혈당측정 시 70 mg/dL 이하였다. 이 약을 실포닐우레아 또는 인슐린과 병용 투여했을 때 하나 이상의 저혈당 이상반응을 나타낸 환자의 비율은 위약군보다 높았다 (표 3 참조).

표 3. 이 약을 글리메피리드 (±메트포르민) 또는 인슐린 (±메트포르민과) 추가 병용 투여한 위약대조 임상시험: 인과관계 평가와 관계없이 보고된 저혈당의 발생률+

글리메피리드 또는 글리메피리드 및 메트포르민과의 병용요법 (24주)	이 약 100 mg + 글리메피리드 (± 메트포르민) (222명)	위약 + 글리메피리드 (± 메트포르민) (219명)
총 발생수 (%)	27 (12.2)	4 (1.8)
비율(보고된/환자-년수*)	0.59	0.24
중증의 저혈당 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)
안정된 용량의 인슐린 또는 안정된 용량의 인슐린 및 메트포르민과의 병용요법 (24주)	이 약 100 mg + 안정된 용량의 인슐린 (50 (16.5))	위약 + 안정된 용량의 인슐린 (± 메트포르민) (319명)
총 발생수 (%)	50 (16.5)	25 (7.8)
비율(보고된/환자-년수*)	1.06	0.51
중증의 저혈당 (%)	2 (0.6)	1 (0.3)
용량 조절 중인 인슐린 또는 용량 조절 중인 인슐린 및 메트포르민과의 병용요법 (24주)	이 약 100 mg + 용량 조절 중인 인슐린 (50 (16.5))	위약 + 용량 조절 중인 인슐린 (± 메트포르민) (329명)
총 발생수 (%)	83 (25.2)	121 (36.8)
비율(보고된/환자-년수*)	1.7	3.6
중증의 저혈당 (%)	10 (3.0)	13 (4.0)

+ 저혈당 이상반응은 모든 증상이 있었던 저혈당 보고에 근거하였으며 혈당 측정이 반드시 수반되는 것은 아니었다; ITT (Intent to treat) 군

* 총 발생수에 근거한환 사람이 여러 건을 보고할 수 있음)

§ 중증의 저혈당은 의학적 처치를 필요로 하거나 의식이 저하된 수준이거나 의식을 잃거나 발작하는 경우로 정의되었다.

2개의 단독요법 임상시험, 메트포르민 추가 병용요법 임상시험 및 피오글리타존 추가 병용요법 임상시험의 종합분석 결과, 이 약 100 mg을 투여한 환자에서 이상반응으로서의 저혈당의 발생빈도는 위약의 경우와 유사했다 (이 약 100 mg 1.2%, 위약 0.9%). 이 약과 로시글리타존 및 메트포르민 추가 병용요법 임상시험에서 저혈당의 18주까지 발생빈도는 이 약 투여군에서 2.2%, 위약 투여군에서 0.0%였다. 54주까지 발생빈도는 각각 3.9%와 1.2%였다. 24 주간 실시된 위약 대조 요인설계 임상시험(factorial trial)에서 이 약과 메트포르민 을 초기병용투여시 저혈당의 발생빈도는 위약군에서 0.6%, 이 약 단독투여군 에서 0.6%, 메트포르민 단독투여군에서 0.8%, 이 약과 메트포르민 병용투여군 에서 1.6%이었다.

실험실적 검사

이 약 100 mg을 투여한 군에서 실험실적 이상반응의 발생률은 8.2%이고, 위약을 투여받은 군에서는 9.8%이었다. 임상시험에서 최종주의 증가에 기인한 백혈구치의 약간의 증가(위약 투여수와 이 200 cells/L 차이: 평균 기준치 약 6600 cells/L)가 관찰되었다. 이런 차이는 많은 연구에서 나타

났다. 모든 연구에서 나타난 것은 아니며, 임상검사치의 변화가 임상적으로 관련이 있는 것으로는 여겨지지 않았다. 12주간의 연구에서 91명의 만성 신장애환자와 37명의 중증도의 신장애환자가 이 약 50 mg으로 무작위 배정 되었고 같은 정도의 신장애를 가진 14명의 환자는 위약으로 배정되었다. 혈청 크레아티닌의 평균(표준오차) 증가는 이 약 투여군에서 0.12 mg/dL(0.04), 위약투여군에서 0.07 mg/dL(0.07)이었다. 위약과 비교 시 혈청크레아티닌 증가 의 임상적 유의성은 알려지지 않았다.

국내임상시험결과

다국가, 이중맹검, 무작위배정, 위약대조, 병행군 연구로 530명의 아시아인에서 실시된 기아임상시험에서 이 약의 안전성과 유효성이 평가되었으며, 이 중 한국인은 95명이었다. 한국인에서의 이 약의 안전성 프로파일은 위약과 전반적으로 유사하였으며, 이전의 임상시험에서 보고된 결과와 유의한 차이를 나타내지 않았다.

2) **시판 후 이상반응**

다음은 이 약의 시판 후 추가로 확인된 이상반응이다. 이 이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 발생빈도를 신뢰성 있게 예측하거나 약물-출과의 인과관계를 확립하는 것은 일반적으로 불가능하지 않다. 아나필락시스, 혈관부종, 발진, 두드러기, 피부혈관염 및 스티븐스-존슨 증후군을 포함한 비극성 피부질환을 포함하는 과민반응(1. 경고 항 참조), 간호식(1차 상충: 치명적/비치명적 출혈성 또는 과다성 해장염을 포함하는 급성 해장염(1. 경고, 2) 해장염 항 참조); 급성신장증(폐로 투석을 요한을 포함한 신기능 약화; 상기도감염; 비인두염; 변비; 구토; 두통; 통증 및 장애를 동반 하는 관절통(5. 일반적 주의, 2) 통증 및 장애를 동반하는 관절통 항 참조); 수포성 유사진포창(5. 일반적 주의, 3) 수포성 유사진포창 항 참조); 근육통; 사시통; 등통증; 갑상선 결절성; 소양증; 혈소판감소증(4). 시판 후 사용 중에 스타틴 계열 약물과 복용 시 횡문근융해증이 보고되었다. (국내 실마리 정보 분석 - 평가 결과)

3) **국내 시판 후 조사결과**

① 국내에서 재심사를 위하여 6년동안 3,453명을 대상으로 실시한 사용성적 조사결과 유효사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 4.87%(168/3,453명)[232건]으로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해 반응 발현율은 1.56%(54/3,453명) [64건]로 ‘저혈당’ 0.26%(9/3,453명) [9건], ‘소화불량’, ‘어지러움’이 각각 0.12% (4/3,453명)[4건], ‘ALT 증가’, ‘AST 증가’, ‘설사’, ‘구역’, ‘두통’이 각각 0.09%(3/3,453명)[3건] 등으로 보고되었다. 중대한 유효사례는 인과관계와 상관없이 0.12% (4/3,453명)[5건]로 ‘폐렴’, ‘당뇨병성’, ‘대사성산증’, ‘낙상’, ‘심장정지가’ 각각 0.03%(1/3,453명)[1건]로 나타났다. 이 중 중대한 약물유해반응은 ‘당뇨합병증’ 0.03% (1/3,453명) [1건]로 보고되었다. 예상하지 못한 유효사례는 인과관계와 상관없이 3.04%(105/3,453명)[137건]로 보고되었고, ‘소화불량’ 0.32%(11/3,453명) [12건], ‘어지러움’ 0.23%(8/3,453명)[8건], ‘혈중트리글리세라이드 증가’, ‘위염’이 각각 0.17%(6/3,453명)[6건] 등이 보고되었고, 이 중 이 약과 인과 관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물 유해반응은 0.93%(32/3,453명) [35건]로 ‘소화불량’, ‘어지러움’이 각각 0.12%(4/3,453명)[4건], ‘혈중트리글리 세라이드 증가’, ‘저밀도지질단백증자’, ‘고혈압’이 각각 0.06%(2/3,453명)[2건] 등의 순으로 보고되었다.

- ② 이 약에 대한 국내 재심사 유효사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 의약품에 대상으로 보고된 유효사례 보고자료와 재심사 종료 시점에서 통합 평가한 결과, 다른 모든 의약품에 보고된 의약품에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유효사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다. 다만, 이 결과가 해دام성보다 다음의 유효사례 간에 인과 관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
- 위양감에 것애：소화불량, 위염
 - 말단적 실험관 질환：고혈압
 - 대사 및 영양 질환：체중감소
 - 신장질환：발기부전

5. **일반적 주의**

1) 저혈당을 일으키는 것으로 알려진 약과의 병용투여: 다른 혈당저하제와의 병용투여에 전행적으로 그렇듯이, 이 약과 인슐린 또는 실포닐우레아를 병용 투여 시 저혈당이 관찰되었다 (4. 이상반응 항 참조). 실포닐우레아 또는 인슐린에 의한 저혈당의 위험을 감소시키기 위해 실포닐우레아 또는 인슐린의 강도를 고려할 수 있다 (용법용량 항 참조).

2) 중증 및 장애를 동반하는 관절통 DPP-4 저해제를 복용한 환자의 시판후 조사에서 중증 및 장애를 동반하는 관절통이 보고되었다. 약물 투여 이후 중증의 발생시기는 1일 후부터 수년 후까지 다양하였다. 약물 투여 중지 시에 증상은 완화되었다. 일부 환자에서는 동일한 약 또는 다른 DPP-4 저해제에 다시 복용시에 증상의 재발이 나타났다. 중증 관절통의 원인으로 DPP-4 저해제를 고려하여 적절한 경우 투여를 중지한다.

3) 수포성 유사진포창

DPP-4 저해제를 복용한 환자의 시판 후 조사에서 입원을 필요로 하는 수포성 유사진포창이 보고되었다. 환자들은 일반적으로 DPP-4 저해제 투여중지 및 국소 또는 전신 면역억제제 치료로 회복되었다. 환자들에게 이 약을 복용하는 동안 수포 또는 피부병이 발생하면 즉시 의사에게 보고하도록 일려야 한다. 만약, 수포성 유사진포창이 의심되는 경우, 이 약을 중단하고 진단 및 적절한 치료를 위해 피부과 전문의에게 의뢰해야 한다.

임상작용

유효성작용 연구에서 시타글립틴은 다음 약물의 약동학에 임상적으로 유의한 영향을 미치지 않았다: 메트포르민, 로지글리타존, 피오글리타존, 심바스 타틴, 위약 및 경구피임제. 이 시험에 근거하여 CyP3A4, CyP2C8, CyP2C9 및 위약 양동에 수송체의 기질에 적용되지 않을 것으로 예상된다. 제2형 당뇨병환자에서 1일 2회 복용하는 메트포르민과 이 약의 병용투여는 이 약의 약동학을 유의하게 변화시키지 않는다.

사이클로스포린: 강력한 p-glycoprotein 억제제인 사이클로스포린 600 mg 과 병용하여 단회투여시 시타글립틴의 AUC(29%)와 Cmax(88%)가 증가되었 으나, 시타글립틴의 약동학의 변화는 임상적으로 유의하지 않은 것으로 여겨 진다. 사이클로스포린 또는 다른 p-glycoprotein 억제제와 병용투여시 유의한 상호작용은 없을 것으로 예상된다. 다국산：이 약 100 mg과 10일간 병용투여시 다국산의 혈장 AUC(11%)와 Cmax(18%)가 약간 증가하였다. 다국산 투여시 적절한 모니터링을 하여야 하며 이 약 및 다국산의 용량조절은 필요치 않는다.

7. **임부, 수유부, 소아 및 고령자에 대한 투여**

1) **임부에 대한 투여**

이 약을 대상으로 한 대조시험 결과는 없으므로 임부에서의 사용은 권장되지 않는다.

2) **수유부에 대한 투여**

이 약은 모유에서 유증과 혈중에 4:1의 비율로 분비되는 것으로 보고되었으며 수유부는 투여하지 않는다.

3) **소아에 대한 투여**

18세 미만의 소아 및 청소년에서의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다.

4) **고령자에 대한 투여**

허가 전 임상시험에서 총 피험자(3884명) 중 65세 이상이 725명, 75세 이상이 61명이었다. 65세 이상 고령자에서의 안전성과 유효성은 젊은 환자에서와 유사하였다. 이 환자군과 젊은 환자군 사이에 병용상에 차이는 없었으나 일부 고령자에게 감수성이 증가할 수 있음을 배제할 수는 없다.

이 약은 대체로 신장상으로 배설되는 것으로 알려져 있다. 고령자는 신장 기능이 감소되기 쉬우므로 고령자에서의 용량 선정시 주의해야 하며, 이 약 투여 전 및 투여 후 주기적으로 신장기능을 평가하는 것이 권장된다.

8. **과량투여시의 처리**

이 약의 임상시험에서 건강한 성인을 대상으로 이 약을 800 mg까지 단회투여 한 경험이 있다. 이 약 800 mg을 투여한 한 연구에서 평균 Q1c의 증가가 최대 8.0 msec까지 관찰되었으나 임상적으로 관련이 없는 것으로 여겨진다. 과량투여 시에는 일반적인 대증치료(예를 들면 흡수되지 않은 약물을 위장 관으로부터 제거하고 심전도를 포함한 임상모니터링을 실시)을 하며, 환자의 상태에 따라 보조적인 치료를 실시한다.

이 약은 투석으로 일부 제거될 수 있습니다. 임상시험에서 투여량의 약 13.5% 가 3~4시간 이상의 혈액투석 시에 제거되었다. 정시간의 혈액투석에 임상적 으로 적절하다면 고려되어야 한다. 이 약이 복막투석으로 제거되지는 않았는지 여되었다.

9. **의약품동등성시험 정보** ^(*)

가. 시험약: 자누글리아정100밀리그램/시타글립틴염산염수화물(신일제약)과

대조약: 자누비아정100밀리그램/시타글립틴염산염수화물(한국에스디(유))을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 26명의 혈중 시타글립틴을 측정한 결과, 비교약 유효성치(AUC, C_{max})를 고려한하여 통계적 유사함을 보, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8 에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구 분	비교평가항목		참고평가항목	
	AUC _{0-24hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조 약	3093 ± 494	402.1 ± 107.2	2.50 (0.50~6.00)	8.61 ± 1.43
시험 약	3108 ± 500	420.2 ± 117.6	1.75 (0.50~6.00)	8.43 ± 1.26
90% 신뢰구간* (기준: log 0.8~log 1.25)				
log 0.9928 ~ 1.0225				
log 0.9668 ~ 1.1376				
—				
—				

나. 의약품동등성시험기준 제7제2항에 따라, 시험약 자누글리아정25밀리그램 (시타글립틴염산염수화물) 및 자누글리아정50밀리그램/시타글립틴염산염수화물(신일제약)은 대조약 자누글리아정100밀리그램/시타글립틴염산염수화물(신일제약)과의 비교용출시험결과를 제출하였으며, 대조약과 용출량 상이 등동하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

⁽