

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

[성분·함량] 1정 중

• 유효성분

진피(KP).....	11mg
육계(KP).....	46mg
회향(KP).....	12mg
육두구(KP).....	10mg
정향(KP).....	6mg
겐티아나(KP).....	7.5mg

고목(KP).....	7.5mg
탄산수소나트륨(KP).....	312.5mg
침강탄산칼슘(KP).....	66.5mg
합성규산알루미늄(KP).....	136.7mg
탄산마그네슘(KP).....	13mg(산화마그네슘으로서 5.46mg)
디아스타제·프로테아제·셀룰라제2000 II (KP).....	20mg
(전분당화력 78~110단위, 전분호화력 140~240단위)	

• 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)

• 첨가제 : 물엿, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, L-멘톨, 전분글리콘산나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 하프로멜로오스

[성상] 흰색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림, 식욕감퇴(식욕부진), 소화불량, 과식, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만 15세 이상 : 1회 2정 / 만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1.33정 / 만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1정
1일 3회 식후 30분에 복용(사용)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

1) 투석요법을 받고 있는 환자 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 테트라사이클린계 항생제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 신장장애 환자 2) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우

2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.

3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 20정

[제조/외지] (주)테라젠이텍스 / 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동)

[제조자] 한솔신약(주) / 충청북도 음성군 금왕읍 청평길 2-11

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. ※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요. ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(의약품유해사례)에 알려주시기 바랍니다. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7111이나 www.etexpharm.co.kr 에서 확인할 수 있습니다.