

고함량 비타민B군 복합제 빅코민백골드 정



1 once a day
하루 한 번 하루 한 알!!

- 신진대사에 필수적인 비타민 공급
- 만성피로 · 활력 · 에너지 보충
- 육체피로 · 체력저하 · 피로회복
- 신경통 · 근육통 · 관절통 · 피부염
- 눈의 피로 · 구내염 · 항산화성분

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 첨부문서를 확인하세요.

【유효성분】	1정 중
폴리타르타르산염(USP)	100mg
이노시톨(KP)	100mg
γ-오리자놀(KP)	10mg
벤포티아민(KP)	50mg
티아민질산염(KP)(티아민염산염으로서 36.15mg)	50mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	100mg
폴산(KP)	0.5mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg
D-비오틴(USP)	0.5mg
시아노코발라민(KP)	0.5mg
푸르셀티아민(KP)	10mg
신화아연(KP)(아연으로서 12mg)	15mg
아스코르브산(KP)	61.86mg

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민 B, B₂, B₆, C의 보급
- 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후
- 이 약에 함유된 티아민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부부 · 각기 · 눈의피로

【용법 · 용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - (3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 - (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - (2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - (1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - (3) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - (4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - (5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - (6) 신장장애 환자
 - (7) 저단백혈증 환자
 - (8) 통풍환자 또는 신장결석에 있는 환자
 - (9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우(다음 각호의 배합성분별 이상반응을 기재할 것)
 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 위장장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종, 구토
 - (2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - (3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - (4) 폴산이 부족한 환자에게 티아민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

일반의약품 정보 계속됨

- (5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (7) 항암도스테로이드, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것
- (3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- (4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.
- (6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【참가제】

- 참가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)
- 참가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크
- 기타참가제 : 경질수구수산, 미강절셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저지완도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스보비온, 탭솔드칼셀(99B411), 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】 적갈색의 정방형 필름코팅정

【포장단위】 80정/포(1정/포x40)x2

【제조자】 미래제약(주) / 경기도 안성시 공단2로 104

【판매자】 경보제약 (주)종근당홀딩스가족회사 / 충청남도 아산시 실목로 174

*본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입한 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

*이 문안은(2021년 04월 06일)작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 약품 정보는 미래제약 홈페이지 또는 약품통령정보시스템(https://ndrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

*제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644- 6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

*소비자상담실 : 02-521-2308 / www.miraepharmkorea.co.kr

Rev.01



18806575038320

제조번호 :

사용기한 :