

효과 빠른 코감기약

하디큐노즈

연질캡슐

꽃물/코막힘/재채기

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분

아세트아미노펜(KP)	200.00mg
브로페니라민말레산염(BP)	2.50mg
슈도에페드린염산염(USP)	15.00mg
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소, 가축)
- 기타 첨가제: 소르비톨스페셜글리세린벤젠, 정제수, 치자청색소, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜, 홍화황색소

[성상] 연한노랑의 액상 내용물이 든 노랑색의 투명한 장방형 연질캡슐

[효능·효과] 감기의 증상(여러 증상)(꽃물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용
만 8세 이상 ~ 만 15세 미만: 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

※ 사용상의 주의사항

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부 반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부 반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용하여서는 안 된다.
- 4) 슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(적정액)
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

진해(기침을 그치게 함)거담제(기침약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(적정액, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화)가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것
- 2) 만 3개월 미만의 영아(적정액, 갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영아(적정액, 갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세 미만 영아(적정액, 갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 기러움 등)을 일으킨 적이 있는 사람

Rp Bio

- 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을) 곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장 문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 7) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍, 관절염, 항응고제, 스테로이드 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기력이 동반되는 기침, 1주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 기러움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을) 곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상)이 나타난 경우
 - ① 속쓰림·폐식: 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕은, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피괴사증(리엘 증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신 피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
 - ④ 천식
 - ⑤ 간 기능 장애: 전신의 나른함, 황달(따부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 - ⑥ 간질성 폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡 곤란, 발열 등이 나타난다.
 - ⑦ 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 경해진용법 용량을 잘 지킬 것
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것
- 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
- 6) 바르비탈계 약물, 심한 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대차시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기(적은 서늘한 곳에)에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐/상자(10캡슐/PTP*1)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국 의약품 안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 주의해 주십시오

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난거나 변질, 변색, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

◆ 소비자상담실: ☎080-024-0030(수신자 부담 콜로 서비스)

[판매원] 광동제약(주) 서울특별시 서초구 서초중앙로 85

[제조원] (주)알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

[작성일자] 2021.03.26

P.I.210309-000

Rp Bio