

비타민B12·비타민B6 함유
비타민B12 1mg 함유
고함량 비타민B12 함유

비맥스 메타비
B-max Meta B tab.



일반의약품

KGMP적격업체

분류번호: 03190



8 806581 082006

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분:	
벤포타이민(티아민염산염으로서 72.3 mg)(KP)	100 mg
비스벤타이민(티아민염산염으로서 26.2 mg)(KP)	30 mg
리보플라빈(KP)	100 mg
니코틴아미드(KP)	10 mg
판토텐산칼슘(KP)	100 mg
피리독신염산염(KP)	100 mg
α-비오틴(USP)	0.1 mg
폴산(KP)	0.5 mg
히드록스코발라민아세트산염(히드록스코발라민으로서 1 mg)(KP)	1 mg
콜린타르타르산염(USP)	100 mg
이노시톨(KP)	100 mg
클레칼시메롤을충분(비타민D로서 1000 IU)(EP)(동물유래성분: 양, 양모)	10 mg
L-시스테인(JP)	25 mg
산화아연(아연으로서 30.0 mg)(KP)	37.4 mg
우르소데옥시콜산(KP)	30 mg
셀레늄함유조조호(셀레늄으로서 21.6 μg)(KP)	40 mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 60.3 mg)(KP)	100 mg
첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이벨간색(200F650003), 크로스카멜로오스 나트륨, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스	

【성상】 빨간색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력저하) - 발육기 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 이 약의 발음투량 - 구루병의 예방 - 각기 - 노인피로
 - 다음 증상의 원화: 신경통, 근육통, 관절염(요(허)리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

2. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalcemia) 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인 불분명한 만성 염증질환) 신장(콩팥)질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 신장(콩팥)결석 환자
- 심장 증상의 심부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
 - 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 5) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
 - 6) 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 7) 신장(콩팥)장애 환자
 - 8) 저단백혈증 환자
 - 9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
 - 10) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 붉은 반점, 부진수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡기 악취, 발모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초 신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 폴산이 부족한 환자(예 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병×2), 90정/병, 180정/상자(90정/병×2)

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- 부작용 피해구제 신청: 한국약의약품안전관리원(644-6223)

첨부문서 작성일: 2022년 07월 07일

【판매원】(주)녹십자 / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업 【제조원】(유)한통제약/전라북도 완주군 봉동읍 원주산단6로 301 2로 586 11, 080-260-0033 1~3층, 5층, 봉동로 705