

가스트큐

[반하사심탕]

일반의약품

[원료약품 및 그 분량]

■ 유효성분	1정(650밀리그램) 중
반하(KP)	835.0mg
황금(KP)	500.0mg
건강(KP)	415.0mg
인삼(KP)	500.0mg
감초(KP)	500.0mg
대추(KP)	500.0mg
황련(KP)	165.0mg
이상 수침 건조엑스로서	500.0mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성인산화규소, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스2910, 폴리에틸렌글리콜6000

[성상] 갈색의 장방형 코팅정제

[용법용량] 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사 때와 식사 때 사이에)복용한다.

[효능효과] 명치가 답답하고, 때때로 구역, 구토가 있고, 식욕부진(식욕감퇴) 하며, 배에서 소리가 나고, 묽은 변 또는 설사 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 급·만성 위장카타르, 발효설사, 소화불량, 위하수(위저짐), 신경성위염, 위장허약, 속취, 트림, 속쓰림, 구내염(입안염), 신경과민

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애)환자
- 3) 부종(부기)환자
- 4) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨적이 있는 환자
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타 난 경우
- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아 지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압 상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 피부: 발진·발적, 가려움, 두드러기 등
- (4) 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달 등(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)
- (5) 간질성폐렴 : 발열, 기침, 숨참, 호흡곤란 등
- 2) 1개월(급성 위장카타르, 속취, 트림, 속쓰림에 복용할 경우에는 5~6회) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.(영역과립(제일약품)에 한함)
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이저드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것.
- 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[포장단위] 10 정/상자(10정/PTPX1)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[소비자상담실] 080-990-8200

[판매원] 영진약품(주)(서울특별시 송파구 올림픽로 35단지 13(신정동7-16))

[제조외지사] (주)알파바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7)

[제조자] 경방신약(주)(인천광역시 남동구 남동대로 394)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오

※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

설명서 작성일자 : 2021. 10. 04

※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다