

【원료약품 및 그 분량】

■ 유효성분 1캡슐(520밀리그램) 중

승마(KP)	1,250mg
목단피(KP)	940mg
당귀(KP)	630mg
황련(KP)	630mg
생지황(생규)	630mg
이상물건조엑스	375.36mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

■ 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호, 황색4호

■ 기타 첨가제 : 옥수수전분, 콜로이드성이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 캡슐

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상부 열은 회적색, 하부 흰색의 경질캡슐제

【용법용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에)복용한다.

【효능효과】 위열(胃熱)에 의한 치통

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 염증성 열이 있는 환자
- 2) 몸에 열이 있는 환자
- 3) 몸이 허약하여 마른 기침을 하는 환자
- 4) 비위가 허약하고 장이나 위에 적체가 있는 환자
- 5) 신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 황련, 목단피에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다.)
- 6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락 토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 2) 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
- 3) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 4) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 5) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위해가 있었던 환자
- 6) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 설사 등
 - (2) 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 뇨 등)
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
- 3) 1주 이상 계속하여 복용하지 말 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 10 캡슐/상자(10캡슐/PTP X 1)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36 개월

【소비자상담실】 080-990-8200

【판매원】 영진약품(주)(서울특별시 송파구 올림픽로 35다길 13(신정동7-16))

【제조회사】 (주)알파바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7)

【제조사】 경방신약(주)(인천광역시 남동구 남동대로 394)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
 ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
 ※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오
 ※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
 ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오