

일반의약품 정보

이 약을 사용(복용)하기 전에 반드시 첨부문서를 확인하세요.

【유효성분】	1정 중
디시클로민염산염(KP).....	5mg
파파베린염산염(USP).....	15mg

【효능·효과】 위통, 복통(배아픔), 산통, 위산과다, 속쓰림

【용법·용량】

성인(만15세이상) : 1회 2정, 1일 2~3회
 만8세이상-만15세미만 : 1회 1정, 1일 2~3회 식후 또는 식간에 복용하십시오.
 다만, 1일 2회 이상 복용시에는 4시간 이상의 간격을 두고 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1)만 7세 이하의 어린이 2) 이 약을 위장을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 스코폴라미 엑스 함유 제제 및 다른 위장운동-진정제 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등을 일으킬 일이 있는 사람 2) 심장장애

환자, 뇌졸중의 통증, 눈의 침침함 등) 또는 배노장애 환자, 허약자 또는 고령자 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 성당시 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타날 경우 2) 이 약을 복용함으로써 구갈, 변비의 증상이 나타날 수 있습니다. 또 두통, 인면홍조, 눈부심, 배노장애 등이 나타날 경우 3) 여러차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 7타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 3) 이 약을 복용함으로써 시야장애, 눈부심 등이 나타날 수 있으므로 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계작업을 하지 않도록 주의하십시오. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오. 3) 오염(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 **【사용기한】** 케이스 측면 표시일까지

【첨가제】 • 동물유래성분 : 유당수화물(소의 우유)
 • 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치환도하드록시프로필셀룰로오스, 하드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘

【성상】 원색의 원형 정제

【포장단위】 10정/피티피, 1000정/피티피(10정/피티피x100)

【제조자】 SUNGMY 성이바이오(주)

강원도 원주시 지정면 지리울로 184 1층 일부, 3층 Tel: 02-3413-3358

【판매자】 경보제약

동근당울딩스 가계회사



KyongboPharm



동근당울딩스

가계회사

일반의약품



복합 진경제

위 통 복 통 산 통 위산과다 속쓰림

이너베린정 (디시클로민염산염+파파베린염산염)

10정

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 포장케이스의 기재사항을 주의감게 읽어보시고 포장케이스를 항상 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 부작용 신고 및 피해 구제 상담 : 1644-6223

작성 연월일: 2022.11.03 [V01]

SUNGMY
BIO