



ActeverTM Tab.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg(동물유래성분(소, 연골))
벤포티아민(KP)	60mg(티아민염산염으로서 43.4mg)
니코틴아미드(KP)	60mg
이노시톨(KP)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	25mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)	10mg(비타민D로서 1000IU)(동물유래성분(양, 양모))
시아노코발라민1000배산(KP)	20mg(시아노코발라민으로서 20μg)
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg(리보플라빈으로서 3.4mg)
감마-오리자놀(KP)	5mg
산화아연(KP)	24.92mg(아연으로서 20.0mg)
첨가제 : 메타규산알루미늄마그네슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이빨간색(200F650003), 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, D-만니톨	

[성상] 적갈색의 타원형 필름코팅정

[효능 · 효과]

- 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
 - 발육기
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방
 - 각기
 - 눈의피로
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
- 아연의 보급

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcomoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장(콩팥)결석 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 만 1세 미만의 젖먹이
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 신장(콩팥)장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 설사, 묽은변, 식욕부진, 복부팽만감, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
 - 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
 - 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 45정, 90정

[제조원] (유)한풍제약 - 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

[판매원] 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 52

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2021년 4월 15일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.
※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
※ 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
※ 사용기간이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
※ 의사, 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.
※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
※ 이 제품의 포장은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 포장(hard push)을 사용하여 약의 잘못 사용, 남용 및 어린이 약물중독을 예방하고 있습니다.