알리콕시브정 30mg

(에토리콕시브)

분류번호 : 114 KGMP
전문의약품 적격검체

【성분·분량】1 정 중
· 유효성분 : 에토리콕시브(벌크) 30.0mg
· 첨가제(유효성분) : 정제코어 : 칼륨포논, 실리콘이형제
· 첨가제(유효성분) : 무당구제(기한 : 소, 시중부터 : 우유)
· 기타 첨가제 : 무수인산수소칼슘, 제립정제용포도스, 소화수용선이제용, 이산화티타늄, 오페드라이(OPADRY®white)(321A050H5), 크로스카멜로오스나트륨, 포비돈
【성 상】 장밍색 사각 모양의 양면이 볼록한 필름피복정
【효능·효과】
관절염(골관절염(퇴행성)의 증상)(수시) 진통의 완화
선택성 COX-2 억제제인 이 약물 투여하는 경우, 개개 환자의 전반적인 위험성을 평가해야 한다. (시중심의 주의사항 5. 일반적 주의 참고)
【용법·용량】
이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 개개 치료법의 잠재적인 유용성과 위험성을 고려해야 한다. 이 약의 복용량과 가장 낮은 유효 기간의 증가량으로 환자 개별 반응에 따라 적정해야 한다. 이 약 투여 시 고혈압, 활혈성심부전, 부종 등의 이상반응이 나타날 수 있으므로, 최소한 매일 정기적으로 환자에 생길 수 있는 이상반응에 대한 투여 지속 여부 및 치료에 대한 반응을 재평가하여야 한다.
관절염 : 권장용량은 1일 1회 30 mg이며, 1일 300mg을 초과해서는 안된다.
경증동맥경화 치료로 유익성이 있는 경우 이 약의 투여를 중단해야 한다.
진행해 환자 : 증량 및 장등도 간질에(Child-Pugh score 5~6 환자에서 권장되는용량의 1/2), 간질에 중증(Child-Pugh score 10 이상) 환자에 대한 이 약의 투여권장이 제한하지요로 이 약 투여 시 주의해야 한다. 중등도 간질에(Child-Pugh score 7~9) 환자에서의 투여권장이 없으므로 이 약을 투여해서는 안된다.
신질에 환자 : 경증 및 중등도 신질에 환자(크레아티닌청소율 30 mL/min 이상)에서 용량조절은 필요하지 않다. 중증의 신질에 환자(크레아티닌청소율 30 mL/min 미만)에서의 이 약의 투여에는 권장되지 않는다.
고령자 : 고령자에서 이 약의 용량조절은 필요하지 않다.
【사용상의 주의사항】
1. 경고
1) 병발 시킨 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약에 나타나는 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 만드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이 러한 사례에 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2) 심혈관계 위험 : 이 약은 중대한 심혈관계 합병증, 심근경색 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 시장약일수 시간, 또는 비스테로이드성 소염진통제 약물에 과에 유사한 개월이 발생할 수 있다. 위험 가진. 투여 동안, 기저 심혈관계 위험 인자에 따라 이러한 위험성이 증가할 수 있다. 심혈관계 질환이 있는 환자에서는 더 위험한 수준이 있다. 이 약으로 치료하는 환자에서 심혈관계 이상반응에 대한 잠재적 위험을 최소화하기 위해 가능한 가장 짧은 기간 동안 사용해야 한다. 의사가 환자는 이 약의 이러한 심혈관계 증상이 발현해 대해야 신중히 모니터링해야 하며, 가능 심혈관계 질환의 발병이 있는 경우에는 바로가지로 처중해야 한다. 환자는 증대된 심혈관계 질환의 위험성 경우 및/또는 증상 및 이러한 증상 (가슴통증, 숨찬, 쇠약, 불명료한 말들이 발병하는 경우 위험 처치에 대해서 사전에 알고 있어야 한다.
3) 위장계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 약물은 큰 최소 경증의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며 이는 시장약일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간, 동반해 경고 증상 및에 발생할 수 있다. 고령자는 증대된 위장관계 이상반응의 위험에 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 증대된 위장장계 이상반응의 발생 가능성이 증가할 수 있으나 단기 투여에 이러한 위험이 면한 해치지는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 환자 위장관계 질환 및 궤양 또는 출혈의 징후 및 증후에 대해 신중히 모니터해야 하며, 이러한 증상이 발생하는 경우 이 약의 투여를 중단해야 한다. 이 약을 투여하는 환자 위장관계 질환 및 궤양 또는 출혈의 징후 및 증후에 대해 신중히 모니터해야 하며, 이러한 증상이 발생하는 경우 이 약의 투여를 중단해야 한다. 이 약을 투여하는 환자 위장관계 질환 및 궤양 또는 출혈의 징후 및 증후에 대해 신중히 모니터해야 하며, 이러한 증상이 발생하는 경우 이 약의 투여를 중단해야 한다.
4) 간기능 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 약물 중 일부 약물에 있어 간기능 이상 및 간염 및 황달 및 간기능 이상 및 간염 및 황달 및 간기능 이상 및 간염 및 황달 및