

엠플진[®] 10mg, 25mg

(엠파글리플로진)

990061-001

[원료약품 및 그 분량] 1정 중, **엠플진10mg:**

- 유효성분** 엠파글리플로진(법규)..... 10.0mg
- 첨가제(동등물상비율)** 셀락토오스(소-우유)
- 기타첨가제** 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이(QX노란색(S21A620003), 아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필 셀룰로오스

엠플진25mg:

- 유효성분** 엠파글리플로진(법규)..... 25.0mg
- 첨가제(동등물상비율)** 셀락토오스(소-우유)
- 기타첨가제** 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이(QX노란색(S21A620003), 아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필 셀룰로오스

[성상]

- 엠플진10mg:연한 노란색의 양면이 볼록한 원형 필름코팅정
- 엠플진25mg:연한 노란색의 양면이 볼록한 다원형 필름코팅정

[효능효과]

이 약은 성인 제 2형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향상시키기 위해 식이요법 및 운동요법의 보조제로 투여한다.

- 1) 약은 단독요법으로 투여한다.
- 2) 약은 다음의 경우 병용요법으로 투여한다.
 - 이전 당뇨병 발병 여부를 받은 경력이 없었으며 단독요법으로 충분한 혈당 조절이 어려운 경우 이 약을 메트포르민과 병용투여
 - 메트포르민 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우, 이 약을 병용투여
 - 메트포르민과 부수한 타아존 병용요법, 또는 메트포르민과 설폰닐우레아 병용요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우, 이 약을 병용투여
 - 인슐린인슐린 단독 또는 메트포르민 병용 또는 메트포르민과 설폰닐우레아 병용)요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 없는 경우, 이 약을 병용투여
 - 메트포르민과 디펩티딜 펩티다제-4 (DPP-4) 저해제인 리나글리틴 병용요법으로 충분한 혈당 조절을 할 수 없는 경우, 이 약을 병용투여

혈당이 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병 환자중 심혈관계 질환이 확인된 환자에서 심혈관계 사건 발생에 대한 영향은 '사용상의 주의사항' 10. 전조항을 위한 정보) 임상시험 정보'항을 참고한다.

[용법용량]

이 약의 권장용량은 단독요법 및 인슐린 등 다른 혈당 강하제와의 추가 병용요법에 대하여 1일 1회 10mg이다. 이 약 10mg에 내약성이 우수하면 수 추가적인 혈당조절이 필요한 경우, 이 약 용량을 1일 1회 25mg으로 증량할 수 있다.

이 약과 설폰닐우레아 또는 인슐린을 병용투여시에는 저혈당 발생의 위험을 감소시키기 위해 설폰닐우레아 또는 인슐린의 용량감소를 고려할 수 있다.(사용상의 주의사항3. 이상반응을 참 한).

이 약은 식사와 관계없이 투여할 수 있다. 장제는 통째로 씹어서 복용한다. 이 약의 복용을 잊었을 때에는 생각나는 즉시 복용한다. 하루에 두 배의 용량을 복용하지 않는다.

특수 집단

1) **신장에 환자**

경증의 신장에 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다.

사구체 여과율(GFR)(41 60ml/min/1.73m² 미만인 환자[또는 CrCl<60ml/min]에게 이 약으로 치료를 시작해서는 안된다.

이 약에 내약성이 우수한 환자 중 사구체 여과율이 계속적으로 60ml/min/1.73m² 미만인 환자[또는 CrCl<60 ml/min]는 이 약의 용량을 1일 1회 10mg으로 조절하거나 유지하여야 한다. 사구체 여과율이 45ml/min/1.73m² 미만[또는 CrCl<45 ml/min]으로 감소하는 경우 이 약을 중단해야 한다.

말기 신질환(ESRD) 또는 투석 중인 환자에서는 이 약의 유효성이 기대되지 않으므로 이 약을 사용하지 않는다.

2) **신장에 환자**

경증 또는 중등증의 신장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않다. 중증의 신장애 환자에 대하여 연구되지 않았으므로, 이 약의 사용이 권장되지 않는다.

3) **장장자**

연령에 따른 용량조절은 필요하지 않다. 75세 이상의 환자는 신장 기능과 체액량 감소 위험을 고려해야 한다. 85세 이상의 고령자에서의 임상경험이 제한적이므로, 이 약의 투여를 시작하는 것은 권장되지 않는다(사용상의 주의사항, 4. 일반적 주의 항 참고)

[사용상의 주의사항]

1. **다음 환자에는 투여하지 말 것**

- 1) 이 약의 주성분 및 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 제1형 당뇨병 또는 당뇨병성 케토산증 환자
- 3) 사구체 여과율 (eGFR)(41 30 mL/min/1.73m² 미만인 환자, 말기 신질환(end stage renal disease) 또는 투석 중인 환자
- 4) 이 약을 용량에 함유하고 있으므로, 갈락토오스 분해성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애에 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하여야 안 된다.

2. **다음 환자에는 신중히 투여할 것**

1) 신장애 환자

사구체 여과율(eGFR)(41 60 mL/min/1.73m² 미만인 환자[또는 CrCl<60 mL/min]에게 이 약으로 치료를 시작해서는 안 된다. 이 약에 내약성이 우수한 환자 중 사구체 여과율이 계속적으로 60mL/min/1.73m² 미만인 환자[또는 CrCl<60 mL/min]는 이 약의 용량을 1일 1회 10mg으로 조절하거나 유지하여야 한다. 사구체 여과율이 계속적으로 45 mL/min/1.73m² 미만[또는 CrCl<45 mL/min]일 경우에는 이 약을 중단해야 한다.

말기 신질환(ESRD) 또는 투석 중인 환자에서는 이 약의 유효성이 기대되지 않으므로 이 약을 사용하지 않는다.

2) 신기능 저하된

이 약의 유효성은 작용기전으로 인해 신기능에 의존적이다. 따라서 다음의 신기능 모니터링이 권장 된다:

- 이 약 투여를 시작 전 및 투여 이후 정기적으로 (1주에 1회 이상)

- 신기능을 감소시킬 수 있는 병용 약품들의 투여 전

3) 신부전

NH4class-I에서 경험은 제한적이므로, 이들 환자에서는 신중히 사용하여야 한다. NH4class-III에 대한 이 약의 임상시험 경험이 없기 때문에 이 약의 사용이 권장되지 않는다.

3) 인슐린 및 설폰닐우레아와 같은 인슐린 분비 촉진제는 저혈당을 일으킬 수 있다. 따라서, 이 약과 병용시 저혈당의 위험을 줄이기 위해, 인슐린 또는 인슐린 분비 촉진제의 용량을 줄여야 할 수 있다.

3. **이상반응**

1) 안전성 프로파일의 요약

제2형 당뇨병 환자 15,582명을 대상으로 이 약의 안전성이 평가되었다. 이 약을 단독요법 또는 메트포르민, 설폰닐우레아, 피오글리타존, DPP-4 저해제 또는 인슐린과의 병용요법으로 이 약을 투여한 환자는 10,004명이었다. EMPA-REG OUTCOME® 임상연구에 심혈관계 고위험군 환자 7,020명(이 약 10 mg/일(n=2,345명), 이 약 25 mg/일(n=2,342) 또는 위약 (n=2,333)을 최대 4.5년동안 투여받았다. 이 연구에서 엠파글리플로진의 전반적인 안전성 프로파일은 이미 알려진 안전성 프로파일과 유사하였다.

18주 및 24주간 진행된 6개의 위약대조 임상시험에 참여한 3,534명의 환자 중 위약을 복용한 환자는 1,183명이고 이 약 10mg을 투여받은 환자는 1,185명, 이 약 25mg을 투여받은 환자는 1,166명이었다. 전반적인 이상반응 발생률은 이 약군과 위약군이 유사하였다. 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 설폰닐우레아 또는 인슐린과 병용했을 때 저혈당이었다. (3) 특정 이상반응에 대한 설명 항 참조.

2) 이상반응 목록

위약 대조 시험에서 이 약을 투여한 환자에서서 보고된 이상반응을 기관계(SOC) 및 MedDRA 용어로 분류하여 표 1에 나타내었다.

이상반응은 절대 빈도나 다른 나라와 비교하여, 빈도는 다음과 같이 정의되었다: 매우 흔하게 (≥1/10), 흔하게 (≥1/100 ~ <1/100), 흔하지 않게 (≥1/1,000 ~ <1/100), 드물게 (≥1/10,000 ~ <1/1,000), 매우 드물게 (<1/10,000), 또는 불명 (이용 가능한 자료를 통해 평가할 수 없음).

표 1 위약 대조 시험 및 시판 후 경험에서 보고된 이상반응

기관계	매우 흔하게	흔하게	흔하지 않게	드물게	매우 드물게	빈도불명
감염		질모노리야증, 위음부질환, 귀두염 및 기타 생식기 감염, 요로 감염 (신우신염 및 요로성 폐렴증 포함)			회음부 괴저(fournier's gangrene) ^b	
대사 및 영양장애 또는 인슐린과 병용임		저혈당(설폰닐우레아)		케토산증 ^a		
피부 및 피하조직계		가려움증(일반적인), 발진 ^a	두드러기 ^a			혈관부종 ^a
혈관계			체액량 감소 ^a			
신장 및 비뇨기계		배뇨 증가 ^a	배뇨 곤란		간질성 신세뇨관염 ^a	
진신 및 투여부위 이상		갈증				
진단검사		혈청 크레아티닌 증가 ^a , 사구체여과율 감소 ^a , 헤마토크리트 증가				

^a참조항에는 아래 해당되는 단락 참고

^b시판 후 경험에서 확인됨

3. 특정 이상반응에 대한 설명

① 저혈당

저혈당의 발생빈도는 각 임상시험에 사용된 기저 요법에 따라 좌우되었다. 이 약을 단독요법 또는 추가 병용요법(메트포르민, 피오글리타존, 설폰닐우레아, 리나글리틴+메트포르민)으로 투여하였을 때 저혈당 발생 빈도는 이 약군과 위약군에서 유사하였다. 이 약을 메트포르민+설폰닐우레아 또는 인슐린+메트포르민+설폰닐우레아와 병용하였을 때 위약군에 비해 이 약군에서 저혈당의 발생 빈도가 높았다(표 2 참조).

주요한 저혈당 (치지가 필요한 사건)

이 약을 단독요법 또는 추가 병용요법(메트포르민+설폰닐우레아, 피오글리타존+메트포르민, 리나글리틴+메트포르민)으로 투여하였을 때 주요한 저혈당의 발생 빈도는 위약에 비해 이 약에서 높지 않았다. 이 약을 인슐린+메트포르민+설폰닐우레아와 병용하였을 때 위약군에 비해 이 약군에서 주요한 저혈당의 발생 빈도가 높았다.

표 2 임상시험 및 효능효과 별로 확인된 저혈당의 발생 빈도 (1245.19, 1245.20, 1245.23_{met}, 1245.23_{met+su}), 1245.33, 1245.49, 1275.9_{met}, 1245.25 ~ TS)

투여군	위약	이 약 10mg	이 약 25mg
단독투여 (1245.20) (24주)			
N	229	224	223
저혈당(%)	0.4%	0.4%	0.4%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
메트포르민 병용(1245.23 _{met}) (24주)			
N	206	217	214
저혈당(%)	0.5%	1.8%	1.4%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
메트포르민 + 설폰닐우레아 병용 (1245.23 _{met+su}) (24주)			
N	225	224	217
저혈당(%)	8.4%	16.1%	11.5%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
피오글리타존 +/- 메트포르민 병용 (1245.19) (24주)			
N	165	165	168
저혈당(%)	1.8%	1.2%	2.4%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0%
기저 인슐린 (+/- 메트포르민 +/- 설폰닐우레아) 병용(1245.33) (18weeks) / 78 weeks)			
N	170	169	155
저혈당(%)	20.6% / 35.3%	19.5% / 36.1%	28.4% / 36.1%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	1.3% / 1.3%
MDI 인슐린 +/- 메트포르민 병용 (1245.49) (18주) / 52주)			
N	188	186	189
저혈당(%)	37.2% / 58.0%	39.8% / 51.1%	41.3% / 57.7%
주요한 저혈당(%)	0.5% / 1.6%	0.5% / 1.6%	0.5% / 0.5%
메트포르민 + 리나글리틴 병용(1275.9) (24주) ^a			
N	110	112	110
저혈당(%)	0.9%	0.0%	1.7%
주요한 저혈당(%)	0%	0%	0.9%
EMPA-REG OUTCOME 임상연구 (1245.25)			
N	2333	2345	2342
저혈당(%)	27.3%	28%	27.6%
주요한 저혈당(%)	1.5%	1.4%	1.3%

확인된 저혈당: 혈당 < 70 mL/dL 또는 치지가 필요함

주요한 저혈당: 치지가 필요한 저혈당

^a1회 식사 임상시험용을 투여받은 환자 수

^b인슐린 기저요법 용량은 초기 18주 동안 안정화되었다.

^c메트포르민 기저요법에 엠파글리플로진+리나글리틴 5mg 고정용량 복합제가 투여되었다.

- ② 혈모노리야증, 위음부질환, 귀두염 및 기타 생식기 감염은 위약과 비교하여 이 약에서 빈번하게 보고되었다 (이 약 10mg 4.0%, 이 약 25 mg 3.0%, 위약 1.0%). 여성에서는 위약에 비해 이 약에서 빈번하게 보고된 반면, 남성에서는 그 차이가 크지 않았다. 생식기 감염은 증증 내지 중등증이었다.
- ③ 배뇨 증가, 배뇨 빈도, 배뇨 또는 야간뇨 포함)가 위약에 비해서 이 약에서 빈번하게 보고되었다. (이 약 10 mg 3.5%, 이 약 25 mg 3.3%, 위약 1.4%). 배뇨 증가의 정도는 대부분 증증 내지 중등도이었다. 야간뇨의 빈도는 이 약군과 위약군에서 유사하였다 (<1%).
- ④ 요로감염
 - 요로감염의 발생빈도는 전반적으로 이 약 25mg군과 위약군에서 유사하였고, 이 약 10mg군에서 높았다 (이 약 10mg 8.8%, 이 약 25 mg 7.0%, 위약 7.2%). 위약과 유사하게 이 약에서야 만성 또는 재발성 요로감염의 과거 병력이 있는 환자에서 요로감염이 빈번하게 보고되었다. 요로 감염의 정도(증증, 중등증, 중증)는 이 약군과 위약군에서 유사하였다. 요로 감염은 여성에서는 위약군에 비해 이 약군에서 빈번하게 보고되었다(나성에서는 차이가 없었다).
- ⑤ 체액량 손실
 - 체액량 손실(혈동소/혈압감소, 수축기혈압감소, 탈수, 저혈당, 혈액량감소, 기립성저혈압, 또는 신장 질환)의 발생빈도는 전반적으로 이 약군과 위약군에 유사하였다 (이 약 10 mg 0.6%, 이 약 25 mg 0.4%, 위약 0.3%). 체액량 손실 이벤트의 빈도는 75세 이상의 환자에서 이 약군에 비해 이 약군에서 높았다 (이 약 10mg 2.3%, 이 약 25mg 4.3%, 위약 2.1%).
- ⑥ 혈청 크레아티닌 증가 및 사구체 여과율 감소
 - 혈청 크레아티닌 증가 및 사구체 여과율 감소의 전반적인 발생빈도는 이 약군 및 위약군에서 유사하였다 (혈청 크레아티닌 증가: 이 약 10 mg 0.6%, 이 약 25mg 0.1%, 위약 0.5%; 사구체 여과율 감소: 이 약 10mg 0.1%, 이 약 25mg 0%, 위약 0.3%). 이러한 변화는 치료가 지속되는 동안 일시적이거나 이 약 투여가 중단된 이후 대체로 가역적이었다.

4) 시판 후 조사결과

다음은 이 약의 시판 후 추가로 확인된 약물이상반응이다. 이 약물이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것으로서, 발생빈도를 신뢰성 있게 예측하는 것은 불가능하지 않다.

- 케토산증(당뇨병성 케토산증 포함)
- 요로생염증 및 신우신염
- 발진
- 두드러기
- 혈관부종
- 회음부 괴저

5) 국내에서 채집사를 위하여 6년 동안 3,231명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 13.9%(450/3,231명, 총 6062건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관 없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.

발현빈도	기관계 명	인과관계와 상관없이 중대한 이상사례 17.0%(5/3,231명, 67건)	인과관계를 배제할 수 있는 중대한 약물이상반응 0.15%(5/3,231명, 5건)
각종 위장관 장애	설사, 오심, 위염, 구역, 구토, 복통성 결장염, 대장 출혈		
	감염 및 기생충 감염	편도염, 충수 농양, 충수염, 수막염, 만성 소장염, 만성 주위 농양, 폐결핵, 급성 신우신염, 패혈증, 피하 농양, 뇌간-난소 농양, 전정 신경염	급성 신우신염
	리중 신경계 장애	두통, 뇌간색, 두개 내 동맥류	
전신 장애 및 투여 부위 병태	발열, 혈관 스펀트 협착, 관상 스펀트 협착증		
	임상 검사	알라닌 아미노 전이 효소 증가, 아스파르트산 아미노산 전이 효소 증가	
	신장 및 요로 장애	요관 결석증, 급성 신 손상	요관 결석증
생식계 및 유방 장애	고장 경부 농양		고장 경부 농양
	대사 및 영양 장애	저혈당, 당뇨병, 지나트를 혈증	저혈당, 지나트를 혈증
	피부 및 피하 조직 장애	당뇨성 발	
근골격 및 결합 조직 장애	등허리 통증		
	리중 눈 장애	녹내장, 병적 근시, 망막 박리, 망막 정맥 폐색, 열공 망막 박리	
	순상, 중독 및 시술 합병증	사지 손상, 도로 교통사고, 비강 손상, 흉골 골절	
각종 심장 장애	협심증, 프린트메탈 협심증, 관상 동맥 질환		

	각종 혈관 장애	심부 정맥 혈전증	
	양성, 악성 및 상해 불명의 신생물(난종 및 용종 포함)	바터 증대부의 양성 신생물, 양성 난소 종양, 방광암, 위암, 폐암(난종 및 용종 포함)	
	간담도 장애	급성 담낭염, 지가 면역성 간염, 담석증	

흔하지 않게 (0.1~1% 미만)

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

발현빈도	기관계 명	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 11.54%(373/3,231명, 506건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 3.28%(106/3,231명, 126건)
각종 위장관 장애		상복부통증, 충치, 위 궤양, 미란성 위염, 복부 불쾌감, 결장염, 입 건조, 위 식도 역류 질환, 구토, 복부 팽창, 항문 출혈, 만성 위염, 허혈성 결장염, 장염, 고창, 위 용종, 치은 부종, 탈반 매복, 치핵, 대장 출혈, 복강 낭종, 직장 통증, 비만	설사, 소화 불량, 복통, 오심, 위염, 위장관 장애, 충치, 복부 불쾌감, 입 건조, 복부 팽창
	감염 및 기생충 감염	상기도 감염, 기관지염, 연조직염, 만성 부비동염, 위장염, 편도염/박막염 감염, 치주염, 충수 농양, 충수염, 만성 췌관염, 결핵염, 인플루엔자, 후두염, 수막염, 만성 충치염, 손발톱 주위염, 편도 주위 농양, 폐렴, 폐결핵, 패혈증, 피하 농양, 완 벽색, 치아 농양, 난관-난소 농양, 전정 신염염	비인두염, 상기도 감염, 치주염, 치아 농양
	각종 신경계 장애	체후성 어지러움, 감각 저하, 지각 이상, 기억 상실증, 정동맥 협착, 뇌경색, 장노 신경 병증, 알콜 마비, 두 개 내 동맥류, 기억 이상, 신경통, 파킨슨증, 다발 신경 병증, 감각 장애, 졸음, CNS 기원 현훈	두통, 체후성 어지러움, 얼굴 마비, 졸음
전신 장애 및 투여 부위 병태		피로, 말초 부종, 인면 부종, 말초 종창, 혈열, 얼굴 충창, 오장, 이상한 눈금, 부종, 통증, 전차 부위 통증, 혈관 스펀트 협착, 혈관 스펀트 협착증	홍통, 피로, 말초 종창, 얼굴 충창, 부종
	임상 검사	알라닌 아미노 전이 효소 증가, 아스파르트산 아미노 전이 효소 증가, 체중 증가, 심전도 이상, 헤모글로빈 증가, 혈리코박티 시험 양성, 소변 혈전류 양성	체중 증가, 심전도 이상, 헤모글로빈 감소
	신장 및 요로 장애	요관 결석증, 급성 신 손상, 만성 신장병, 혈뇨, 고다뇨증, 신장 손상, 소변 정체, 소변 이상	요관 결석증, 혈뇨, 신장 손상, 소변 정체, 소변 이상
생식계 및 유방 장애		양성 전립선 과형성, 발기 기능 장애, 위축성 외음염증, 자궁 경부 비염증, 자궁 경부 염종, 음낭 통증, 성 기능 장애, 질 분비물	양성 전립선 과형성, 발기 기능 장애, 위축성 외음염증, 자궁 경부 염종, 질 분비물
	대사 및 영양 장애	저혈당증, 식욕 감소, 비만, 다음증, 당뇨병, 고지혈증, 지나트를 혈증, 비타민D 결핍	저혈당증, 고혈당증, 식욕 감소, 다음증, 지나트륨 혈증
	피부 및 피하 조직 장애	진피 농종, 지루성 피부염, 이트피 피부병, 당뇨성 발, 원형 습진, 궤양, 피지선 과형성	
근골격 및 결합 조직 장애		요추 척추관 협착, 근육통, 사지 통증, 근골격성 흉부 통증, 관절통, 경추 협착, 섬유 근육통, 열구리 통증, 골절, 근육 쇠약, 근골격 병증, 골관절염, 골다공증, 회전 근근 증후군	등허리 통증, 사지 통증, 근골격성 흉부 통증
	각종 눈 장애	난시, 백내장, 알레르기 결막염, 시야 흐림, 각막 미란, 녹내장, 황반 섬유화, 안 불완전, 안 증혈, 병적 근시, 망막 박리, 망막 절정체, 망막 정맥 폐색, 망막 망막 박리, 눈꺼풀의 종창, 시각 장애, 유리체 부유물, 유리체 출혈, 안검염, 가래 잔류	
	호흡기, 흉곽 및 종격 장애	비출혈, 천식, 노력성 호흡 곤란, 숨가 기증, 알레르기성 비염, 기관지 잔류	기침, 비출혈, 알레르기성 비염
순상, 중독 및 시술 합병증		사지 손상, 피부 파열, 타박상, 늑골 골절, 뇌진탕, 각막 절과상, 낙상, 손 골절, 정강 인대 증후군, 개방성 안구 손상, 골반 골절, 도로 교통사고, 비강 손상, 흉골 골절	피부 열상, 늑골 골절, 정강 인대 증후군
	각종 심장 장애	협심증, 두근거림, 프린트메탈 협심증, 관상 동맥 질환, 빈맥	
	각종 혈관 장애	동맥 경화증, 심부 정맥 혈전증, 당뇨병성 혈관 장애, 말초 동맥 폐색성 질환	
양성, 악성 및 상해 불명의 신생물(난종 및 용종 포함)		바터 증대부의 양성 신생물, 양성 난소 종양, 방광암, 진주종, 위암, 편광근 종, 폐암, 위암, 위장관 장애, 자궁 병혈근종	
	각종 정신 장애	불안, 우울증, 수면장애	불안
	간담도 장애	급성 담낭염, 지가 면역성 간염, 담석증, 간염	
구 및 비강 장애		잇몸, 체후성 현훈, 현훈	잇몸, 체후성 현훈
	혈액 및 림프계 장애	빈혈, 림프절 병증	빈혈, 림프절 병증
각종 내분비 장애		감상선 저하증, 감상선 종괴	
	각종 위장관 장애	변비, 설사, 소화 불량, 복통, 오심, 위염, 위장관 장애	변비
	감염 및 기생충 감염	비인두염, 대장 포진	
각종 신경계 장애		어지러움, 두통	어지러움
	전신 장애 및 투여 부위 병태	충수 부비관염, 흉통, 무력증	
	임상 검사	체중 감소	체중 감소

흔하지 않게 (0.1~1% 미만)

환산 수치가 250mg/dL 보다 낮더라도 이 약과 관련된 케토산증은 발생할 수 있으므로, 이 약으로

2,342명, 위약: 2,333명)가 투여 받았고 3.1년(중앙값) 동안 추적되었다. 평균 연령은 63세, 평균 HbA1c는 8.1%이었고, 71.5%가 남성이었다. 베이스라인에서 메포프린 투여 환자는 전체 환자의 74%, 인슐린 투여 환자는 48%, 설폰닐우레아 투여 환자는 43%이었다. 사구체 여과율(eGFR)이 60-90 ml/min/1.73 m²인 환자는 52.2%, 45-60 ml/min/1.73 m² 환자는 17.8%, 30-45 ml/min/1.73 m² 환자는 7.7%이었다. 베이스라인에서 관상동맥질환(76%), 뇌졸중(23%), 말초동맥질환(21%)이 확인되었고, 전체 환자의 18%에서 2개 이상의 죽상동맥경화성심혈관계 질환이 확인되었다. 베이스라인에서 시험대상자의 약 81%가 레닌-안지오텐신계 저해제, 65%가 베타-차단제, 43%가 이뇨제, 77%가 스타틴, 86%가 항혈소판제제(대부분 아스피린)를 복용하고 있었다.

12주 시험에서 베이스라인 대비 HbA1c의 보정된 평균(표준오차) 개선율(adjusted mean (SE) improvement)은 위약 0.11%(0.02), 이 약 10 mg 0.65%(0.02), 이 약 25 mg 0.71%(0.02)으로 관찰되었다. 초기 12주 이후 혈당 조절은 두어군에 관계없이 최적화되었고 그 결과, 94주 시험에서 HbA1c의 보정된 평균(표준오차) 개선율은 위약 0.08%(0.02), 이 약 10 mg 0.50%(0.02), 이 약 25 mg 0.55%(0.02)로 그 효과는 악화되었다.

EMPA-REG OUTCOME 임상시험의 일차 평가 변수는 주요 심혈관계 관련 사건(MACE)의 첫 발생까지의 시간이었다. MACE는 심혈관계 질환 사망, 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중으로 정의되었다. 통계 분석은 이 약 10mg과 25mg을 통합하는 것으로 사전에 계획되었다. 사전에 설정된 MACE의 위험비에 대한 비열등성 한계(1.3)에 대해서 비열등성을 검증하고, 비열등성이 입증되면 우월성을 검증하는데 콕스 비례 위험 모델이 사용되었다.

이 약은 위약과 비교했을 때 일차 복합 평가변수(심혈관계 질환 사망, 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중)를 감소시키는 데에 우월하였다(그림 1). 치료 효과는 심혈관계 질환 사망의 유의한 감소에서 기인한 것으로(그림 2), 비치명적 심근경색 및 비치명적 뇌졸중에는 유의한 변화가 없었다.

그림 1. MACE의 추정된 누적 발생률




그림 2 심혈관계 질환 사망의 추정된 누적 발생률




표 3 일차 복합 평가 변수, 각 구성요소에 대한 치료 효과^a

	위약	이 약	위험비 vs 위약 (95% CI)
시험대상자 수	2333	4687	
MACE(심혈관계 질환 사망, 비치명적 심근경색, 비치명적 뇌졸중) 사건 N (%)	282 (12.1)	490 (10.5)	0.86 (0.74, 0.99)*
심혈관계 질환 사망 N (%)	137 (5.9)	172 (3.7)	0.62 (0.49, 0.77)
비치명적 심근경색 N (%)	121 (5.2)	213 (4.5)	0.87 (0.70, 1.09)
비치명적 뇌졸중 N (%)	60 (2.6)	150 (3.2)	1.24 (0.92, 1.67)
모든 원인 사망률 N (%)	194 (8.3)	269 (5.7)	0.68 (0.57, 0.82)
바-심혈관계 사망률 N (%)	57 (2.4)	97 (2.1)	0.84 (0.60, 1.16)

a 치료군(Treated set, TS), 즉 시험약을 1회 이상 투여 받은 환자

b 이 약 10mg과 25mg 통합

* MACE의 위험비에 대한 비열등성 한계는 1.3으로 설정되었고, 비열등성 입증 후 우월성을 검증하는데 Cox비례 위험 모델이 사용되었다. 본 시험 결과가 중간 분석에 포함되었기 때문에, 유의성(significance)을 위한 p값(0.0498 미만)에 해당되는 95.02% 양측 신뢰구간이 적용되었다.

심부전으로 인한 입원(Heart failure requiring hospitalization)

심부전으로 인한 입원에 관한 평가변수는 탐색적 목적으로 평가되었다.

EMPA-REG OUTCOME 시험에서 엠파글리플로진은 위약과 비교하였을 때 심부전으로 인한 입원의 위험을 감소시켰다(엠파글리플로진 2.7%; 위약 4.1%; 위험비[HR] 0.65, 95% CI 0.50, 0.85).

신장병증 (Nephropathy)

신장병증에 관한 평가변수들은 탐색적 목적으로 평가되었다.

EMPA-REG OUTCOME 시험에서, 복합평가변수인 신구 또는 악화된 신장병증 (현상발부인노 발생, 혈청 크레아티닌의 2배 증가, 신장 치환 요법 (혈액투석) 시작 및 신장병으로 인한 사망으로 정의됨)의 첫 발생까지의 시간에 대한 위험비[HR]는 0.61(95% CI 0.53, 0.70)이었다. (엠파글리플로진 12.7%, 위약 18.8%).

또한 현상발부인노가 있는 환자에서 지속적인 정상발부인노 또는 미세알부민노로의 전환은 위약(대비 엠파글리플로진에서 더 높게 나타났다. (엠파글리플로진 49.7%, 위약 28.8%, 위험비[HR] 1.82, 95% CI 1.40, 2.37).

3. 의약품동등성시험정보

가. 시험약 엠파양정25밀리그램(엠파글리플로진)[주동구바이오제약]과 대조약 자디양정25밀리그램(엠파글리플로진)[한국베링거인겔하임(주)]을 2x2 교차시험으로 각 1쌍씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 31명의 혈중 엠파글리플로진을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-48hr}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구 분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-48hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	자디양정25밀리그램 (엠파글리플로진) [한국베링거인겔하임(주)]	2987±553	368.5±78.9	3.00 (1.00~6.00)	7.23±1.12
시험약	엠파양정25밀리그램 (엠파글리플로진) [주동구바이오제약]	3050±625	366.3±88.7	2.50 (1.00~4.00)	7.64±1.40
90% 신뢰구간* (기준: log0.8 ~ log1.25)		log0.9866 ~ 1.0466	log0.9093 ~ 1.0533	-	-

(AUC_{0-48hr}, C_{max}, t_{1/2}; 평균값±표준편차, T_{max}; 중앙값(범위), n=31)

AUC: 투약시간당 최고혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max}: 최고혈중농도

T_{max}: 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2}: 말단 소실 반감기

*비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

나. 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 엠파양정10밀리그램(엠파글리플로진)[주동구바이오제약]은 대조약 엠파양정25밀리그램(엠파글리플로진)[주동구바이오제약]과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

[포장단위] 30정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효기간이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※가장 최근 개정된 제품 설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※제품에 관한 문의사항은 동국제약(주) ETC마케팅실 ☎02-2191-9949; 수신자 요금부담)로 문의하십시오.

※부작용 피해구제 신청: 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

• 제조의뢰자: **동국제약(주)** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

• 제조자: **(주)동구바이오제약** 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길18 (상산리 901-3)

설명서 최종 개정 연월일: 2025. 05. 16

Dongkook | 동국제약