

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
KGMF 적격업체
2105-00



액상이라 효과 빠른
종합 감기약

쑥쑥 에프
(연질캡슐)

【원료약품 및 성분량】 1캡슐 중

■ 유효성분:

아세트아미노펜(KP).....	200.00mg
구아니페딘(KP).....	41.00mg
슈도에페드린염산염(USP).....	15.00mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP).....	8.00mg (일수화물)
클로르페니라민말레산염(KP).....	1.25mg
dl-메틸에페드린염산염(KP).....	6.00mg

■ 첨가제(타르색소): 청색 1호, 적색 40호

■ 첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽)

■ 기타 첨가제: 폴리메틸렌글리콜400, 정제수, 프로판렌글리콜, 포비돈, 소르비톨소르비탄 액

【성상】 미향색의 투명한 액이 든 적색의 투명한 정방형 연질캡슐

【효능·효과】 감기의 증상(여러 증상) (코물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 열리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용하십시오.

【사용상의주의사항】

1. 경고

- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다.
- 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.
- 슈도에페드린 함유 의약품 복용 시 급성 전신성 발진성 농포(고름 물집)증(AGEP)과 같은 증증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름 물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 고 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 찬식을 일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(간난이)
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨스제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

진해(기침을 그치게 함)가당제(가래제), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항스타틴제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간난이) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오).
- 만 3개월 미만의 영아(간난이)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우라도 만 2세 미만의 영아(간난이), 유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영아(간난이), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 복내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
출연, 천식, 만성기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨(소변을 누)곤란, 목마름(지속적이거나 심함), 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속(아랫배)와(상) (과민성 소) : 복용 후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막만증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피괴사증(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있습니다.
③ 급성 전신성 발진성 농포(고름 물집)증(AGEP)과 같은 증증(심한 증상) 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다.
④ 천식
⑤ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다.
⑥ 간질성 폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다.
⑦ 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배앓이), 직장 출혈 등)이 발현(드러냄)될 경우
3) 5-6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 복용 시에는 음주하지 마십시오.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 비르비탈계 약물, 심한 경우 호흡을 방해할 수 있는 약물을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장 방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장 단 위】 10캡슐

【제조 의뢰처】 에이프로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두마리길 16

【제조 자】 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리 3로 30 빌딩

【판매 자】 (주)대웅생명과 / 서울특별시 송파구 선로 42

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 개정일자(2021년 05월 10일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약물안전전력원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자상담실 (02)561-4011