

메가브이벤정



일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 :

벤토티아민(티아민염산염으로서 72.3mg)(KP).....	100mg
리보플라빈(KP).....	100mg
니코틴아미드(KP).....	100mg
판토텐산칼슘(KP).....	108.7mg
피리독신염산염(KP).....	100mg
이노시톨(KP).....	100mg
폴산(KP).....	100µg
클린타르타르산염(USP).....	100mg
D-비오틴(USP).....	100µg
산화아연(아연으로서 25mg)(KP).....	31.2mg

아스코르브산(KP).....	97mg
시아노코발린 1000배산(시아노코발린으로서 100µg)(KP).....	100mg
감마-오리자놀(KP).....	10mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 12mg)(KP).....	20mg
유비데 카레논(KP).....	2mg
우르소데옥시콜산(KP).....	10mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소,우유)

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스보비돈, 탭솔드갈락(99B411), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민(B₁, B₂, B₆, C)의 보급 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력 저하 시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통, 어깨 결림 등, 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 탈모(허염), 습진, 피부염, 각기, 눈의 피로

2. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종결핵), 신장(콩팥)질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장(콩팥)결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 8) 이 약은 우유를 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구먹는, 복용하는용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 처방을 받고 있는 환자 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 유아 4) 심장·순환기계기능 장애 환자 5) 신장(콩팥)장애 환자 6) 저단백혈증 환자 7) 감성배당제를 투여 중인 환자 8) 통풍환자 또는 신장(콩팥)질환이 있는 환자 9) 임부 10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있는 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능장애, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량을 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살혈증(hyperursemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상(알코올성 수 있다. 6) 대장암으로 인해, 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(붓기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 7) 약기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 9) 우발적으로 과량복용한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사에 영향을 줄 수 있다. 4) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것. 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈청지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하고 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용/잘못 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(15~30℃) 보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월 [포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병×2) [소비자상담당실] 080-700-8487

[제조회사] 한국로이애프메(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산로9로 100 [제조자] 미래제약(주) / 경기도 안성시 공단2로 104 [판매원] (주)경보약재 증권금융당스 가족회사

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. ※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330) ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식약처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.