

일반의약품

생약성분 함유 눈영양제

포리그론에스 연질캡슐

(레티놀팔미테이트유 • 에르고칼시페롤)

미세먼지로 인한
안구건조 개선

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 (352 밀리그램) 중

유효성분 : 레티놀팔미테이트유(KP).....2mg (비타민E이로서 2,000 I.U)
에르고칼시페롤(KP).....200 I.U

첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호

첨가제(동물유래성분) : 사유(Ancistrodon rhodostoma · Ancistrodon bimiffir · 근연동물,
장간막내지방충), 백납(벌, 벌집), 숙신산젤라틴(소, 가축)

부형제 : 레시틴, 공기름 착색제 : 산화티탄 착향제 : 에틸바닐린

코팅제 : 카르나우바납, 중쇄트리글리세리드

연질캡슐기제 : 농글리세린, 소르비톨액(비결정성)

【성상】 연한 녹색의 점조성 내용물이 든 암갈색의 타원형 연질캡슐

【효능·효과】 ① 다음 경우의 비타민 A, D의 보급

○ 임신 · 수유기 ○ 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 ○ 발육기 ○ 노년기 ○ 이
약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못보는
증상) · 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

【용법·용량】 만 8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 경고 - 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 I.U 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할
위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000
I.U/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이
과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환
환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 3개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석
환자 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. - 1) 만 1세
미만의 젖먹이(어린이에 대한 용법이 있는 경우) 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이
보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아,
유아 ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 I.U/일 이상 섭취한
여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가
추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는
비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을
목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A
투여는 5,000 I.U/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. ② 비타민 D는 모유로 분비되어
신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 5) 신장결석 병력이 있는 환자 6) 고지단백혈증, 당뇨병
성고지혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한
한 이 첨부문서를 소지할 것 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사,
가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종 2) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터
전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있다(비타민
A 함유유제). 3) 우발적으로 과량복용 한 경우 4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 - 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는
보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것. 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히
공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 I.U 이상을 넘지 않도록 한다 4) 지방과부하로 특별한 위험이
예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의
체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용
지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그
지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한
습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른
용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 90캡슐(10캡슐/PTP×9), 180캡슐((10캡슐/PTP×9)×2)

【제조사】 (주)서흥 - 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

【제조외사】 유니메드제약(주) - 본사 : 서울특별시 송파구 삼성로 69 (잠실동) 유니메드빌딩
Tel : (02)2240-5100 http://www.unimed.co.kr
공장 : 충남 아산시 실목로 110-27

【판매자】 (주)경보제약 - 충청남도 아산시 실목로 174

【소비자상담실】 080-500-5100

첨부문서 작성년월일 : 2025. 07. 24

※ 이 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은
약국·병의원 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 아래의 유니메드제약 홈페이지 또는 고객센터실을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

홈페이지 (www.unimed.co.kr) ☎ 고객센터 : 080-500-5100

제조사 서흥

제조외사
UNIMED 유니메드제약

판매자
KyongBo Pharm 宗근당홀딩스 가족회사