

기침과 가래를 빠르게 삭이는

페이지

연질캡슐

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,120 mg) 중
 유효성분 : 덱스트로메토르판브로화수소산염수화물(KP) 10.00 mg
 노스카핀염산염수화물(KP) 8.00 mg
 트리메토클로놀염산염수화물(KP) 1.00 mg
 구아이페네신(KP) 50.00mg
 클로르페니라민말레산염(KP) 1.50mg

기타 첨가제 : 폴리에틸렌글리콜600, 폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 프
 로필렌글리콜, 젤라틴, 부분탈수유동소르비톨, 치자청색소,
 산화티탄

[성상] 무색 내지 연한 파란색의 투명한 액상 내용물이 든 파란색 타원형
 연질캡슐

[용법용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐 식후 30분에 복용

[효능효과] 기침·가래

[포장단위] 12캡슐/상자(12캡슐/PTP*1)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C) 보관

[사용기간] 제조일로부터 36 개월

[소비자상담실] 031-662-1395

[판매원] (주)셀로맥스(경기도 용인시 기흥구 구성로 357 용인테크노밸리
 D동 710호)

[제조원] (주)알피바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)
 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주
 십시오

※ 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의
 약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를
복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를
 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멀미약, 알레르기약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상 의 할 것.

- 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인
 경우도 만 2세 미만 영아(갓난아기), 유아는 의사의 진료를 받아야
 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이약을 복용시키지 않도록 한다. 만 2세
 미만 영아(갓난아기), 유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리
 고 주의 깊게 모니터링해야 한다.
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염
 (코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는
 사람
- 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증
 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 녹내장
 (예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람,
 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람
 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주
 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두
 통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움,
 배뇨(소변을 누) 곤란, 목마름(지속적이거나 심한), 불안, 떨림, 불면
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 만 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 복용시에는 음주하지 말 것.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류
 의 운전 조작을 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여)
 보관할 것
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지
 말 것.