

육체피로·체력 저하·근육통인
하루 한번 고탐량 프리미엄 활성비타민

원광퍼펙타민정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분

· 벤토티아민 (티아민염산염으로서 72.3mg)(KP)	· 콜레칼시페롤농축분말 (비타민D로서 1,000IU)(EP)	10mg
· 리보플라빈(KP)	· 이노시톨(KP)	100mg
· 판토텐산칼슘(KP)	· 산화마그네슘 (마그네슘으로서 12mg)(KP)	100mg
· 피리독신염산염(KP)	· 우르소데옥시콜산(KP)	100mg
· D-비오틴(USP)	· 유비데카레논(KP)	100μg
· 폴산(KP)	· γ-오리자놀(KP)	100μg
· 시아노코발라민 1000배산 (시아노코발라민으로서 100μg)(KP)	· 푸마르산철(철로서 19.72mg)(KP)	100mg
· 아스코르브산(KP)		97mg

[첨가제]

- 동물유래성분 : 유당(젖당)수화물(소,우유)
- 기타첨가제 : 경질수수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈, 탈실드갈색(99B411), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 적갈색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기
- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

2. 철 결핍성 빈혈의 예방 및 치료

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

1) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalciemia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 혈색소증(철대사 이상으로 철이 간장, 췌장(이자)에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
- 5) 신장결석 환자
- 6) 심한 증상의 신부전 환자



일반의약품

- 7) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 8) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 9) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파
- 4) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자
- 10) 임부
- 11) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 붉은 변, 설사, 두드러기, 가려움, 광선과민반응, 복부·위통증, 경련, 열, 혼수, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 7) 우발적으로 과량복용한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1-30℃) 보관

[포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병 x 2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식약처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

제조의회사 : 한국프리임제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100	제조자 : 미래제약(주) 경기도 안성시 공단2로 104	판매원 : 원광제약(주) 전라북도 익산시 춘포면 석암로 11길 165
---	---	---