

일반의약품 정보

[유효성분] 1정(480밀리그램) 중,

판크레아틴(USP) 175.0밀리그램

셀룰라제(KP) 50.0밀리그램

우담즙 건조엑스(생규)---25.0밀리그램(콜린산으로서 11.25밀리그램)

디메티콘(NF) 25.0밀리그램

[성상] ■ 장방형의 장용피를 한 연녹색의 필름코팅정

[효능·효과] ■ 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부(상복부)팽만감

[용법·용량] ■ 만 15세 이상 및 성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. ■ 만 7세 이하의 어린이 ■ 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. ■ 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. ➡

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. ■ 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 ■ 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. ■ 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 ■ 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

6. 저장상의 주의사항 ■ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. ■ 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 ■ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] ■ 밀폐용기, 실온(1-30℃)보관

[사용기한] ■ 옆면의 표시일까지

[첨가제] ■ 첨가제(타르색소): 청색 1호, 황색 4호 ■ 첨가제(동물유래성분): 우담즙건조엑스(소, 담즙), 유당수화물(소, 우유), 판크레아틴(돼지, 돼장) ■ 기타 첨가제: 콜로이드성이산화규소, 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스프탈레이트, 글리세린모노스테아레이트, 피마자유, 히프로멜로오스2910, 산화티탄, 폴리에틸렌글리콜6000

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.
※ 본 제품의 상세정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약물안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
※ 피해구제 상담(14-3330), 의약품 부작용 신고·피해구제 상담(1644-6223)

KGMP 적격업체제품

일반의약품 조제용

판크레아정

300정

제조의뢰 · 판매자

명문제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26
www.mmpfarm.co.kr

제조사

정우신약(주)

충청남도 아산시 신창면
서부남로790번길 60

〈작성 연월일 : 21. 04. 06〉

〈M01〉

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조번호 :

사용기한 :



HDPE
뚜껑 : LDPE
재활용 어려움



(01)08806498078215