



생약성분 위장약
만하사심탕 - 반하, 황금, 건강, 인삼, 감초, 대추, 황련

일반의약품
분류번호: 239

편위장정

소화불량, 속취, 속쓰림, 신경성위염, 구역, 구토

【성분·함량】 1정 중

유효성분 : 반하 (KP)	835mg
황금 (KP)	500mg
건강 (KP)	415mg
인삼 (KP)	500mg
감초 (KP)	500mg
대추 (KP)	500mg
황련 (KP)	165mg
이상 수침건조엑스로서	500mg

첨가제(동물유래) : 유당수화물 (소·우유)

기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 하프록셀로오스2910

【성상】 감색의 정방형 코팅정제

【효능·효과】

명치가 답답하고, 때때로 구역, 구도가 있고, 식욕부진(식욕감퇴) 하며, 배에서 소리가 나고, 묽은 변 또는 설사 경향이 있는 사람의 다음 증상 : 급·만성 위장카타르, 발효설사, 소화불량, 위하수(위차집), 신경성위염, 위장허약, 속취, 트림, 속쓰림, 구내염(입안염), 신경과민

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사 때와 식사 때 사이에)복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 신생아, 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애)환자
- 3) 부종(부기)환자
- 4) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
- (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 두드러기 등
- (4) 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달 등(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨)
- (5) 간질성폐렴 : 발열, 기침, 숨참, 호흡곤란 등
- 2) 1개월(급성 위장카타르, 속취, 트림, 속쓰림에 복용할 경우에는 5~6회) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에티크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정

【제품문의】 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

- ※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조회사의 : 신일제약(주)

제조사 : 경방신약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272

인천광역시 남동구 남동대로 394

공장 : 충청북도 충주시 양성면 북상굴길 28



설명서 개정년월일 : 2021.05.14