

의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

【유효성분】 1캡슐 중

*유효성분 :

산황마그네슘(마그네슘으로서 241.25mg)(KP)	400mg
벤조티아진(티아민염산염으로서 43.38mg)(KP)	60mg
피리독신염산염(KP)	100mg
시아노코발라민	500mcg
도코페롤아세테이트(비타민E로서 300IU)(KP)	300mg
감마오리자놀(KP)	5mg

* 첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호, 적색1호

* 첨가제(동물유래성분) : 백납(벌꿀, 말납), 젤라틴(소, 가축)

* 기타 첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 에틸바닐린, 정제수, 콩기름, 팜유, D-소르비톨액(비결정성), 폴리소르베이트 80

【성 상】 미향색의 유상 내용물을 함유한 임각색의 장방형 연질캡슐

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 E, B1, B6의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 비타민E(도코페롤아세테이트)
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목덜짐, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 비타민B1(티아민염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(오통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로
- 비타민B6(피리독신염산염)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

○ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 12세 이하 어린이 및 성인 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 저역아
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병역이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 갈슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부

7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당증 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구도, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리기 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 혈상이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ S 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구도 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄산을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)에서 보관하세요.

【포장단위】 120캡슐(10캡슐/PTP x 6 x 2)

【사용기한】 제조일로부터 24개월

【제조자】 동방에프티엘㈜ / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

【판매원】 ㈜녹십자 / 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

【소비자상담실】 080-260-0033

※ 본 제형은 공정거래위원회고시 소비하자해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품정보를 참조하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리제(1644-6223)