

트루엑티비오정

(Truactivio Tab.)

【원료약품 및 분량】 1정 중

■ 유효성분	
벤포티아민(티아민염산염(으)로서 65.08mg)(KP)	90.0mg
비스벤티아민(티아민염산염(으)로서 8.75mg)(KP)	10.0mg
리보플라빈부티레이트(KP)	12.0mg
니코틴산아미드(KP)	100.0mg
판토텐산칼슘(KP)	50.0mg
히드록소코발라민아세트산염(히드록소코발라민(으)로서 0.05mg)(KP)	0.05mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	5.0mg
폴산(KP)	0.1mg
시아노코발라민1000배산(시아노코발라민(으)로서 100μg)(KP)	100.0mg
이노시톨(KP)	100.0mg
콜린타르타르산염(USP)	100.0mg
아스코르브산(KP)	100.0mg
산화아연(아연(으)로서 16mg)(KP)	20.0mg
셀레늄함유건조효모(셀레늄(으)로서 13.5μg)(KP)	25.0mg
콜레칼시페롤농축분말(비타민D(으)로서 1000IU)(EP)	10.0mg
우르소데옥시콜산(KP)	10.0mg
유비데카레논(KP)	5.0mg
감마-오리자놀(KP)	5.0mg
D-비오틴(USP)	0.1mg
■ 첨가제: 히드록시프로필셀룰로오스,저치환도히드록시프로필셀룰로오스,스테아르산마그네슘,크로스포비돈,경질무수규산,미결정셀룰로오스,탐실드갈색(99B411),전분글리콜산나트륨	

【성상】 적갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민D, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로 -임신·수유기 -병중병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기 -노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
-뼈,이의 발육 불량 -구루병의 예방 -각기 -눈의 피로
다음증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 아연의 보급

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
(2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
(3) 만 12개월 미만의 젖먹이
(4) 신장결석 환자
(5) 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
(2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 만 1세 미만의 젖먹이
(2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
(3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
(4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
(5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
(6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
(7) 심장.순환기계기능 장애 환자
(8) 신장장애 환자
(9) 저단백혈증 환자
(10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
(11) 신장결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 피부염, 땀.호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
(2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
(3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
(4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
(5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
(6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
(7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
(8) 우발적으로 과량복용 한 경우
(9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
(1) 정해진 용법.용량을 잘 지킬 것.
(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도.감독하에 투여할 것.
(3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
(4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
(5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60 정/병, 90 정/병, 180 정/병(((90정/병)*2)), 30 정/병, 120 정/병(((60정/병)*2))

【제조사】 미래제약(주)

경기도 안성시 공단2로 104

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질, 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 문안은(2021년 07월 12일)작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※소비자상담실 : 02-521-2308 / www.miraepharmkorea.co.kr Rev. 01