

【상상】인노센트의 장방향 정제

【원료약품 및 그 분량】1정(800mcg)의 경우 함유분량 :

아세트아미노펜(타이펜)	300 mg
카페인수소물(카피)	50 mg
에탄아세트(카피)	200 mg
■ 첨가제(타이펜스) : 황색소3B	
■ 첨가제(타이펜스) : 유당수화물(락스, 우유)	
■ 기타첨가제 : 감질무수구산, 스테아르산, 크로스카렐로스, 락토스, 유당수화물, 저지화합도이드록시프로필셀룰로오스, 전분, 라일락나트륨, 크로스카렐로스나트륨, 락토스, 폴리메틸글리콜6000, 황색소3B, 이도록시프로필셀룰로오스, 히드로메틸옥사이드	

【효능효과】

- 1) 두통, 경통, 발열(아열 또는 열) 후 동통(통증), 인후(목)염, 귀의 통증, 관절염, 신경통, 요하리통, 근육통, 건염(아래관절, 어깨통증), 타박상, 골절상, 연골염(허리 통증), 팔관절염(생리통), 외상(상지)의 진통
- 2) 오프레드와 물리하는 증상, 발열 시의 해열

【용법·용량】

1일 3회(아침 공복(빈 속) 식사 후)에 복용한다. 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.

- 만 15세 이상 : 1회 1정
- 만 8세 이상~만 15세 미만 : 1회 1/2정

【사용상의 주의사항】

1. 경고
① 매일 세 잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사의 상담을 받아야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
② 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 만성간 질환성 노보르증후군 전신성 괴혈증(중증(MAGE), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증후군(TEN)) 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부 반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자에게 충분히 알리고, 이 약 복용 후 피부발진이 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
③ 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 매일 최대 용량(4,000 mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 매일 최대 용량(4,000 mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 전신성 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 4) 이 약의 위험(위장)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하여 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상담 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(젖먹이, 갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이에게나 이 약을 투여하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 혈장인 레야우르프증 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의 할 것
- 2) 만 3개월 이상 만 1세 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)는 의사의 진료를 받을 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직하다.
- 3) 빈인, 양친 또는 형제 중에 이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지혈제(타이펜)에 의해 혈액투기 증상에: 발열, 발진, 관절염, 현시, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간기능장애, 신장(콩팥)장애, 심장장애, 갑상선장애, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고령이 있는 사람
- 6) 고령자(노년)
- 7) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨, 통풍, 간질환, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 개장, 충혈문제를 가지고 있는 사람
- 10) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상담 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진(발적/홍반)이 보여질, 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화불량, 위부불쾌감, 이차리통, 난청(귀먹음), 부종(붓기), 이명(귀울림)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 속이(가)나일수록: 복용 후 바로 두드러기, 부종(붓기), 가슴답답함과 함께 안색이 창백하고, 소변이 차고, 식은땀, 숨이(가)나일수록 나타날 수 있다.
② 피부발적(발적)증후군(스티븐스-존슨 증후군): 증상에 피부 괴사(괴사(괴사)증후군): 고열을 동반하고, 발진(발적)증후군이 보여질, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상 나타날 수 있다.
③ 전신
④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위) 황색을 띄게 될) 등이 나타날 수 있다.
⑤ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정확한 용량(용량)을 잘 지킬 것.
- 2) 잠기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 복용 시에는 음식물 잘 것.
- 5) 배변장애 있을, 상한 경우(항문) 및 알코올을 투여한 환자는 다음의 아세트아미노펜을 대시하기는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오랫동안 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】10정/상자(10정/PPX)

【저장방법】밀폐용기, 실온(약 30℃) 보관

【설명서 개정연월일 / 편리번호】2021.05.11 / P205-01

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변색·오염되었거나 손상된 제품은 약국개시지 또는 약품 판매업자에 한하여 교환하여 드려며, 공장개대유통업체에서 고신한 “소비자지원센터(고객)”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 최종 개정일월(2021.05.11) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통합 정보시스템(<https://nodrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부록을 보고 및 피해 구제신청: 한국의약품안전관리원(0544-6223)

포장
개봉
방법



※ 압부분을 위에서
강하게 눌러 총일로
부터 압부를 깨뜨린다

【제조·판매처】

일양약품주식회사
경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
주식회사(대표: 180-021-1070) 6호선(과)우정(전)하
의약품(전) 02-5179-3888 홈페이지: www.jinyang.co.kr