

항산화 함유 고함량 활성비타민제

비타신[®]맥스^정

【성상】 항갈색의 장방형 필름코팅정제

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

벤포티아민(KP)	100 mg
(티아민염산염으로서 72.31 mg)	
리보플라빈(KP)	100 mg
니코틴아미드(KP)	20 mg
판토탄산칼슘(KP)	10 mg
피리독신염산염(KP)	100 mg
비오틴(USP)	0.01 mg
폴산(KP)	0.02 mg
시아노코발라민1000배산(KP)	100 mg
(시아노코발라민으로서 100 µg)	
제미아스코르브산(별규)	52.10 mg
(아스코르브산으로서 50 mg)	
산화아연(KP)	30 mg
(아연으로서 24 mg)	
토코페올아세테이트2배산(KP)	40 mg
(비타민E로서 20 IU)	
셀레늄함유건조효모(KP)	25 mg
(셀레늄으로서 13.5 µg)	
산화마그네슘(KP)	30 mg
(마그네슘으로서 18 mg)	
감미오리지놀(KP)	5 mg
유비데카렌은(KP)	4 mg
우르소데옥시콜산(KP)	30 mg
·동률유래성분: 유당정화물(소의 우유)	
·기타첨가제: 기결정화물로소, 스테아르산마그네슘,	
전분글리콜산나트륨, 저지형도히도록시프탈셀룰로오스,	
클로리드신산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 탈릴드	
노란색(21Y024), 탈릴드클리어(71C152)	

【효능·효과】

1. 다음증상의 비타민 E, B₁, B₆, B₁₂의 보급
 - 육체피로 · 임신 · 수유기 · 병중 · 병후의 회복을 앞는 동안이나 회복 후의 체력저하시 · 노년기
2. 1에 약해 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 각기 · 눈의 피로 · 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
3. 3에의 보급

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12세 이하의 어린이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
 - 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 9) 임부
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 구역, 구토, 설사, 뱀은변, 변비, 위부부종, 위장관장애, 소화장애, 포만감 있는 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈전(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 반창 · 홍시성 약학, 탈모, 조급증, 저혈압, 매부종
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생기가 예전보다 빨리 저거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 예스 트로렌을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈전(심장박동정지) 소인이 있는 환자가 비타신 E를 복용할 경우 혈전혈전(심장박동정지) 위험이 증가할 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능저하 장애 또는 발작병)이 나타날 수 있다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타신 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에

의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고옥살혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 고옥살을 일으킬 수 있다), 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 출혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 9) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 10) 우유 및 우유 유제품을 과량 복용한 경우 11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
- 3) 각종 요강시대에 혈당의 감시를 병행할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감지치에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30 °C) 보관

【포장단위】 120정(60정/병×2)

【수신처담당 고객센터】 080-988-8888

【제조(외)사】 조아제약(주)

경상남도 함안군 함안면 광로3 318

인터넷홈페이지: <http://www.choa.co.kr>

【제조자】 한국코스(주)

충청북도 제천시 길로3 30

- ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으며 사용 전에 주의깊게 읽어주시고, 약과목과 함께 보관하여 주십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나, 변질, 변색, 오손된 자품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<http://www.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)