

항산화제 보충 + 고단위 비타민 B군 함유

빅스코민에프정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

■ 유효성분 : 피리독시염산염(KP)	100mg
d-비오틴(USP)	0.25mg
시아노코발라민1000배산(KP)	30mg
(시아노코발라민으로서 30μg)	
토코페롤아세테이트2배산(KP)	20mg
(비타민 E로서 10IU)	
폴산(KP)	0.2mg
벤토탄아민(KP)	100mg
(티아민염산염으로서 72.3mg)	
니코틴아미드(KP)	100mg
판토탄산칼슘(KP)	100mg
산화아연(KP)	18.7mg
(아연으로서 15mg)	
아스코르브산(KP)	100mg
우르소데옥시콜산(KP)	15mg
이노시톨(KP)	100mg
리보플라빈(KP)	100mg
콜린타르타르산염(USP)	100mg
셀레늄합유건조효모(KP)	46.3mg
(셀레늄으로서 25μg)	

■ 첨가제(동등물): 유당수화물(기원동물: 소, 기원부위: 우유)

■ 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 히드록시프로필 셀룰로오스, 크로스피클론, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 탈실드렌셀(19W623), 탈실드갈셀(59B346), 카르나우바납

[성상] 갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 증상의 비타민 E, B₁, B₆, B₁₂, C의 보급

- 육체피로 ■ 임신·수유기 ■ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 ■ 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨 결림 등), 구각염(입고리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 - 각기 - 눈의 피로

○ 아연의 보급

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인신선, 갈슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요 중에 과량의 옥살린이 배출되는 상태)
- 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 7) 심장 순환기능 기능 장애 환자

8) 신장(콩팥)장애 환자

9) 저단백혈증 환자

10) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우:

위부(복부)불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 저열감, 피부염, 팜·홍홍 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부)통증, 폐부종(부기)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

3) 에스트로겐을 포함한 경우용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막 합성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막합)증의 위험이 증가할 수 있다.

4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

5) 피리독시나를 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.

6) 폴산이 부족한 환자에서 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간 손상을 일으킬 수 있다.

8) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

9) 항알도스테론제, 트리암데논과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

10) 우발적으로 과량복용한 경우

11) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것.
- 3) 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정, 120정

[취급상의 주의사항]

※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 개정일자(2021년 05월 31일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223(신고 및 상담))에서 할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)661-4011

[제조(외)자] 에이브로젠제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

[제조자] (주)시아스제약 / 경기도 화성시 향남읍 발간공단로 32 발간산업단지 32-8

[판매자] (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42