

복합소화제 판디탈 에스 정

소화불량 / 식욕감퇴

과식·체함 / 소화촉진

위부팽만감

SINIL

[성상] 장방형의 녹색 장용필름코팅정

[작성(개정)년월일] 2021.11.30

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 '소비자 분쟁 해결 기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다. ※ 본 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 뒷면의 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품 안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리관(1644-6223)

일반의약품 정보

문류번호: 233

이 약을 사용하기 전 반드시 첨부문서를 확인하십시오.

[유효성분] 1정(609.67mg) 중

판크레아틴 (KP)	175mg
(전분당화력	1,654단위)
(단백소화력	22,365단위)
(지방소화력	677단위)
셀룰라제 (KP)	50mg
(섬유소당화력	60단위)
우담죽건조엑스 (생균)	25mg
(글산으로서	11,25mg)
디메티콘 (NF)	25mg
글리시리진산이칼륨 (KP)	7.3mg
(글리시리진산으로서	6.68mg)

[효능·효과]

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] 만15세 이상 및 성인 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 고혈압 환자, 노인, 심장장애 또는 신장장애 환자, 부정맥(불규칙) 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 이 약은 황색4하(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다. 3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상단시 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약을 복용함으로써 요양이 감소하고, 얼굴과 손발이 붓고, 손이 굳어지고, 헐림이 오르면, 두통 등의 증상이 나타날 경우 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 3) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 장해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여하십시오. 3) 장기간 계속하여 복용하지 마십시오. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 용기 옆면 표기일까지

[첨가제]

첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호 기타첨가제: 디아세틸레이티드 모노글리세리드, 메타크산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 아산화규소, 카르나우바인, 크로스카르멜로스나트륨, 탈크, 프로필렌글리콜, 히드로멜로오스팔레이트