전문의약품 | 분류번호 333

자록스정 10mg, 15mg, 20mg

(리바록사반)

[원료약품 및 그 분량]
· 자록스정10밀리그램(리바록사반) : 1정(93.0mg) 중
유효성분 : 리바록사반(별칭) ..... 10 mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에프젤트타입씨, 오파드라이분홍색(85F640009), 크로스카멜로오스나트륨, 하드록시프로필셀룰로오스
· 자록스정15밀리그램(리바록사반) : 1정(93.0mg) 중
유효성분 : 리바록사반(별칭) ..... 15 mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에프젤트타입씨, 오파드라이피칼색(85F650037), 크로스카멜로오스나트륨, 하드록시프로필셀룰로오스
· 자록스정20밀리그램(리바록사반) : 1정(124.0mg) 중
유효성분 : 리바록사반(별칭) ..... 20 mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
기타첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 에프젤트타입씨, 오파드라이피칼색(85F665036), 크로스카멜로오스나트륨, 하드록시프로필셀룰로오스

[성상]
· 자록스정10밀리그램 : 밝은 핑칸색의 원형 필름코팅정
· 자록스정15밀리그램 : 핑칸색의 원형 필름코팅정
· 자록스정20밀리그램 : 갈색을 띤 핑칸색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]
1. 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소
2. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료
3. 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소
4. 하지의 주요 정형외과 수술(슬관절 및 고관절 치환술)을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방

[용법·용량]
어른 10 mg을 식사와 관계없이 투여하며, 15 mg 및 20 mg은 식사와 함께 투여합니다.

1. 성인
1) 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소
이 약의 권장용량은 1일 1회, 1회 20 mg입니다. 중등도의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 30~49 mL/min)의 권장용량은 1일 1회, 1회 15 mg입니다. 이 약의 1일 최대 용량은 20 mg입니다.
스테로 시술의 경피적 관상동맥중재술(PCI)을 받은 비판막성 심방세동 환자는 리바록사반 1일 1회 15mg [중등도의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 30~49 mL/min)는 1일 1회 10mg], 과 P2Y12 억제제를 최대 12개월간 병용 투여한 제한된 경험이 있습니다. (12, 임상시험성분 참조)
2) 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료/심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소
급성 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료를 위한 이 약의 초회 권장용량은 처음 3주간 1일 2회, 1회 15 mg입니다. 이후의 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료를 위한 추가 장기간 예방을 위한 권장용량은 1일 1회, 1회 20 mg입니다.
심재성 정맥혈전증 또는 폐색전증의 치료를 위한 투여(최소 6개월)를 완료한 후 재발 위험 감소를 위한 연장 투여 시 권장용량은 1일 1회 10mg입니다. 치료 기간 및 치료 용량은 출혈 위험성 대비 임상적 필요성을 고려하여 결정합니다.
심재성 정맥혈전증 및 폐색전증 재발 위험성에 대한 개인별 평가 후에 결정되어야 합니다.

	투여 개간	투여 형수	1일 투여 용량
심재성 정맥혈전증 또는 폐색전증의 치료 및 재발 위험 감소	1~21 일째	15mg 1일 2회	30mg
	22일째 부터	20mg 1일 1회	20mg
심재성 정맥혈전증 또는 폐색전증의 재발 위험 감소	6개월 이상 투여 후	10mg 1일 1회	10mg

이 약의 1일 최대 용량은 처음의 처음 3주간에는 30 mg, 그 이후 치료 기간에는 20 mg입니다.
3) 하지의 주요 정형외과 수술(슬관절 또는 고관절 치환술)을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방
이 약의 권장용량은 1일 1회, 1회 10 mg입니다. 초회투여는 치료약 복용하도록 합니다.
① 15 mg을 1일 2회 복용중인 환자 : 즉시 이 약을 복용해야 하며, 이 경우 만찬에 15 mg 2정이 복용될 수도 있습니다. 다음날부터는 1일 2회, 1회 15 mg 투여를 지속합니다.
② 10, 15, 20 mg을 1일 1회 복용중인 환자 : 놓친 용량을 즉시 복용합니다. 다음날부터는 1일 1회 1정 투여를 지속합니다. 놓친 용량을 보충하기 위하여 1일 투여용량이 권장용량의 두배가 되어서는 안됩니다.

2. 약물의 전환
1) 바파린 K 길항제에서 이 약으로의 전환
① 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸중 및 전신 색전증의 위험 감소
바파린 K 길항제 치료를 중단하고 국제표준화비율(INR, International Normalized Ratio) ≤ 3.0이 되었을 때 이 약의 복용을 시작해야 합니다.
② 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료/심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소
바파린 K 길항제 치료를 중단하고 INR ≤ 2.5이 되었을 때 이 약의 복용을 시작해야 합니다.
용량에 상관 없이 이 약을 복용한 후 INR 검사에 미쳐 끼치는 영향은 알려져 있지 않습니다. INR은 이 약의 혈중 고활성을 측정하기에 적합하지 않으므로 사용되어서는 안 됩니다.
2) 이 약에서 바파린 K 길항제로의 전환
이 약에서 바파린 K 길항제로 바꾸는 동안 부작용의 증가가 예상될 수 있습니다. 다른 항응고제로 바꾸는 동안에는 계속적으로 항응고 작용이 적절히 유지되어야합니다. 이 약은 INR 상승에 영향을 줄 수 있다는 것을 유의해야 합니다. 이 약에서 바파린 K 길항제로 바꾸는 환자는 INR≥2.0 이 될 때까지 바파린 K 길항제를 같이 투여해야합니다. 전환 후 첫 2 일 동안에는 바파린 K 길항제의 표준 용량을 투여하고 이후 INR 검사에 따른 바파린 K 길항제의 용량을 투여해야 합니다. 이 약과 바파린 K 길항제를 같이 투여할 경우에는 INR 검사를 일주일에 최소 3회 이상 2일 간격을 떼개지 INR 검사를 행해야 합니다. 다른 이 약을 중단할 경우에는 마지막 복용 24시간이 지난 후에는 INR 검사를 할 수 있습니다.
3) 비경구 항응고제에서 이 약으로의 전환
비경구 항응고제를 투여하고 있는 환자에게는 다음 예정된 비경구제제(예, 저분자량헤파린)의 투여시간으로부터 0~2시간 전에는, 계속적으로 투여하고 또는 비경구제제(예, 정맥내 미분획헤파린)를 중단한 시점에 이 약의 투여를 시작한다.
4) 이 약에서 비경구 항응고제로의 전환
이 약을 중단하고, 이 약의 다음 복용시점에 비경구 항응고제의 투여를 시작합니다.

3. 신장애 환자
크레아티닌 청소율 50~80 mL/min인 경증의 신장애 환자에서는 용량조절이 필요하지 않습니다.
중증의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~29 mL/min)에 대한 제한적인 임상경험에 따르면 이 약의 혈중 농도가 유의적으로 증가하였으므로 이 약은 주의해야 투여합니다. 크레아티닌 청소율 15 mL/min 미만인 중증 신장애 환자에 대한 임상경험이 없으므로 이 약의 투여는 권장되지 않습니다.
1) 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸증 및 전신 색전증의 위험 감소
중등도의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 30~49 mL/min) 및 중증의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~29 mL/min)에서의 권장용량은 1일 1회, 1회 15 mg입니다.
2) 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료/심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소 / 하지의 주요 정형외과 수술(슬관절 또는 고관절 치환술)을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방
중등도의 신장애 환자(크레아티닌 청소율 30~49 mL/min)에서 용량 조절이 필요하지 않습니다.

4. 간장애 환자
이 약은 혈액응고장애와 관련한 간질환 환자와 중등도(Child Pugh B) 및 중증(Child Pugh C)의 간장애 환자에게는 투여를 피합니다. 이러한 환자에서 이 약의 노출증가 및 출혈위험의 증가가 나타날 수 있습니다.

5. 정맥를 삽입 수 없는 환자의 경우
사용 직전에 이 약을 부수어 물 또는 사과소스와 같은 음료와 섞어서 경구로 투약할 수 있습니다. 또한 이 약을 부수어 위장관 튜브를 통해 소량의 물과 함께 투약 할 수 있습니다. 이 약을 위장관 튜브로 투약하기 전에 튜브가 제대로 위치하고 있는 지 확인해야 하고, 튜브를 물로 세척한 후에 투여해야 합니다.

[사용상의주의사항]

1. 경고
1) 다른 항응고제와 마찬가지로, 이 약을 복용하는 환자에서 출혈의 징후에 대해 주의깊게 관찰해야 합니다. 이 약은 출혈 위험이 증가한 경우 주의하여 투여합니다.
2) 중증의 출혈이 나타나는 경우 이 약의 투여를 중단합니다('10. 과량투여시의 처치' 참 조). 이 약의 치료시 정기적인 노출의 모니터링이 필요하지는 않습니다. 그러나, 예외적인 경우 이 약의 노출정보가 임상적 결정에, 과량투여 및 응급수술에 도움이 되는 경우 anti-Factor Xa 정량 분석이 유용할 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약의 주성분 또는 구성성분에 과민증상이 있는 환자
2) 임상적으로 유의한 출혈 환자(예, 두개내 출혈, 위장관 출혈)
3) 혈액응고장애와 관련한 간질환 환자와 Child Pugh B 및 C 등의 임상적으로 의미있는 출혈 위험성과 관련한 간질환 환자
4) 임부 및 수유부
5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

6. 다음과 같은 질환으로 인하여 출혈 위험성이 증가된 환자
1) 최근의 위장관 궤양 병력
2) 최근의 두개내 또는 척추 뇌내 출혈 병력
3) 최근에 뇌내 혈관이상
4) 최근의 뇌, 척수 또는 안과 수술 병력
5) 최근의 뇌 또는 척수 손상
6) 식도정맥류가 있거나 의심되는 경우
7) 동정맥기형(arteriovenous malformations)
8) 혈관성 동맥류(vascular aneurysms)
9) 출혈 위험이 높은 악성 종양(neoplasm)이 있는 환자

7) 다른 항응고제와 병용시에 주의해야 할 약물
헤파린(enoxaparin, dalteparin 등), 헤파린 유도체(fondaparinux 등), 경구용 항응고제(warfarin, apixaban, dabigatran 등) 등의 다른 항응고제와 병용시에 주의. 단, 이 약과 서로 전환하는 경우 비분획 헤파린(UFH)을 개방 중심 정맥 또는 동맥 카테터(patent central venous or arterial catheter)를 유지하기 위해 투여하는 경우 제외.
8) 급성간상동맥증후군 치료시 뇌졸증 또는 일과성허혈성 발작의 병력이 있는 환자에서의 항혈소판제의 병용

3. 다음 환자에는 신중하게 투여하십시오.
1) 신장애 환자(크레아티닌 청소율 15~49 mL/min)에서 P-gp 억제 및 경증~중등도의 CYP3A4 억제효과가 있는 약물을 병용투여할 경우 이 약의 혈중 농도 상승으로 인하여 출혈 위험성이 증가되므로 주의하여 투여하며, 이 약 투여시의 임상적 유익성이 출혈에 대한 위험성을 상회하는 경우에만 투여하도록 합니다.
2) 다른 항응고제와 마찬가지로 다음과 같은 질환으로 인하여 출혈 위험성이 증가된 환자
① 선천적 또는 후천적 출혈성 질환
② 잘 조절되지 않는 중증의 동맥성 고혈압
③ 활동 궤양성 위장관 질환
④ 혈관성 망막병증
⑤ 기관지확장증이나 폐출혈 병력
3) 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs), 혈소판 응집 억제제 다른 항응고제 또는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 및 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제(SNRIs)와 같이 지혈작용에 영향을 주는 약물을 병용투여하는 환자
4) 아스피린 혹은 아스피린 및 클로피도그렐과 이 약을 병용투여하고 있는 급성관상동맥증후군 환자에서의 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs) 투여는 출혈 위험성이 증가되므로 주의 하여야며, 이 약 투여시의 임상적 유익성이 출혈에 대한 위험성을 상회하는 경우에만 투여합니다.

4. 이상반응
1) 이 약에 대한 안전성은 에피 표피 같이 53, 103명의 환자가 포함된 13개의 3상 임상을 통해 평가되었습니다. 전체 리바록사반 3상 임상에서의 환자수, 1일 투여용량, 최대 투여 기간은 아래와 같습니다.

적응증	환자수*	1일 투여용량	최대투여기간
슬관절 또는 고관절 치환술을 받은 성인 환자의 정맥혈전색전증 예방	6,097명	10mg	39 일
외래진료를 마친 비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸증 및 전신 색전증의 위험 감소	3,990명	10mg	39 일
심재성 정맥혈전증 또는 폐색전증의 치료 및 재발 위험 감소	6,790명	1~21일째 : 30mg 22일째부터 : 20mg 또는 6개월 투여 후 : 10mg 또는 20 mg	21 개월
비판막성 심방세동 환자에서 뇌졸증 및 전신 색전증의 위험 감소	7,750명	20mg	41 개월
급성관상동맥증후군(ACS)을 경험한 환자에서 죽상동맥 혈전성 사건의 발생률 감소	10,225명	5mg 또는 10mg 아스피린과의 병용 혹은 아스피린 및 클로피도그렐 또는 티클로피딘과 병용투여	31 개월
관상 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환(PAD) 환자에서 아스피린과 병용 시 죽상동맥혈전성 사건의 위험 감소	18,244명	아스피린 100mg과 5mg의 병용 또는 10mg 단독 투여	47개월

* 적어도 한번 이상 리바록사반을 투여받은 환자

2) 이 약은 그 약학적작인 적응기전으로 인하여 출혈 후 빈혈을 초래할 수 있는 모든 조직과 장기에서의 잠재출혈에 대한 출혈위험을 위험성 평가와 관련이 있을 수 있습니다. 출혈위험은 특정 환자군, 즉, 조절되지 않은 심한 동맥성 고혈압 및/또는 지혈에 영향을 미치는 병용투여 중인 환자군에서 증가할 것입니다. 그 징후, 증상 및 정도(치명적인 결과를 포함)는 출혈 및/또는 빈혈이 발생하는 위치와 정도에 따라 다릅니다. 출혈성 합병증은 주관적, 장액적, 에시지술, 두통 또는 설명되지 않는 부종, 초원인적 그리고 설명되지 않는 쇼크로 나타날 수 있습니다. 빈혈의 결과로써 극대로 출혈 위험성을 평가할 때 임상적으로 중요한 출혈을 놓치지 않기 위해 적절한 주의가 필요합니다. 출혈성 합병증은 주관적, 장액적, 에시지술, 두통 또는 설명되지 않는 부종, 초원인적 그리고 설명되지 않는 쇼크로 나타날 수 있습니다. 빈혈의 결과로써 극대로 출혈 위험성을 평가할 때 임상적으로 중요한 출혈을 놓치지 않기 위해 적절한 주의가 필요합니다. 만약 임상적 판단에 근거하여 가능하면 적어도 48시간 이전에 2.5mg은 적어도 12시간 이전에 중단되어야 합니다. 혈소판 응집 억제제를 병용하는 환자가 수술이 예정되어 있고(elective surgery) 항혈소판 효과가 필요하지 않은 경우에는 혈소판 응집 억제제는 적어도 4일 전에 중단하는 것이 도움이 될 것입니다. 만약 시술이 지연될 수 없다면, 출혈 위험 증가는 시술의 유익성에 대비하여 평가되어야 합니다. 이 약은 침습시술 또는 외과적 시술 이후 임상적 상황이 허락하는 적절한 지점에 이루어진다면 가능한 빨리 재투여되어야 합니다.
3) 비판막성 심방세동 환자에서 적절한 대체 항응고제로 인한 이 약을 중단한 경우 혈전증의 위험이 증가합니다. 이 약을 빙각적인 출혈 위험이 아닌 다른 사유로 중단시 다른 항응고제의 투여를 고려하여 투여합니다.
10) 인공심장판막을 가진 환자에 대한 안전성 유효성이 확립되어 있지 않습니다. 따라서, 이러한 환자에게 이 약의 투여는 권장되지 않습니다. 리바록사반과 항 혈소판 요법을 비교한 무작위배정, 대조 임상시험에 따르면, 최근에 대동맥 판막 치환술(TAVR)을 받은 환자에게 이 약은 혈전증 예방 목적으로 권장되지 않습니다. 상기 임상시험의 리바록사반 투여 군에서 사망아나 혈전색전증 사건, 생명을 위협하거나 장애를 일으킬 수 있는 출혈 또는 주요 출혈의 위험이 상대적으로 높게 관찰되었습니다.
11) 혈액학적으로 불안정한 매체전증 환자 및 혈전용해제 혹은 매체전정제술이 필요한 환자에서 안전성 유효성이 확립되지 않았습니다. 따라서, 이 약은 이러한 환자에서 미배치 혜파린제 대체로 권장되지 않습니다.
12) 급성심장폐증후군 환자에서 이 약은 아스피린 단독 또는 아스피린과 클로피도그렐과의 병용투여는 연구되었으나, 다른 항혈소판제제, 프라스그렐, 티카그렐의 등와의 병용투여는 연구되지 않았으므로 이 약과의 병용투여는 권장되지 않습니다.(2.5mg 제제)
13) 심음동전증(cardioversion)이 필요한 환자에게 이 약 투여를 시작하거나 계속할 수 있습니다. 이전에 항응고제 치료를 받은 적이 없었던 환자, 경식도 심초음파(transesophageal echocardiogram)하에 적절한 항응고를 위하여 적어도 심음동전전 4시간 이전에 이 약 투여를 시작하야 합니다. 모든 환자에 대하여, 심음동전전 이전에 이 약을 처방한다로 복용하였는지 확인 해야만 합니다. 치료 시작시기와 기간을 결정할 때, 심음동전전을 받는 환자의 항응고 치료에 대한 지침은 진료지침의 권고를 고려하여야 합니다.
14) 시판 후 이 약에 대한 무작위 연구이 보고되었습니다. 리바록사반에 대한 중대한 아닌반응의 중상(구강점막염을 포함한 점막궤양, 고열, 심각한 연해관련(점심증)이 나타나는 경우 의사에게 알리도록 합니다. 무과립구증으로 의심될 경우에는 추가 조사(혈액 수치 관리) 및 적절한 조치이 약의 투여 중단, 다른 장재적인 약물 치료, 환자 모니터링을 실시해야 합니다.
15) 관상동맥폐쇄(PCI) 및 스텐트 시술을 받은 비판막성 심방세동 환자에 투여시 안전성을 평가하기 위한 임상시험이 수행되었습니다. 이러한 환자에서의 유효성 자료는 제한적입니다. 그래도 임과성이발생의 병력이 있는 환자에 대한 자료는 없습니다.
16) 피부반응
스티븐스-존슨증후군/독성표피괴사융해를 포함하는 중대한 피부반응이 이 약의 사용과 관련한 시판 후 조사에서 보고되었습니다. 이 약은 환자에게 처음 처방되었을 때 가장 높은 위험이 있으며 대부분의 사례는 치료 첫 주 안에 발생하였습니다. 심각한 피부 발진이, 혜진, 극심함 및/또는 물집이나 점막병변과 같은 과민증상의 징후와 증상이 나타나는 경우 이 약 투여를 중단해야 합니다.
17) 뇌졸증, 일과성 허혈 발작 또는 두 질환 모두의 병력이 있는 급성 관상동맥증후군 환자에게 이 약의 투여는 제한적 합니다. 수술 후 뇌졸증 발생률은 일과성 허혈 발작의 병력이 있는 급성 관상동맥증후군 환자에 대상으로 한 제한적인 유효성 자료에 따르면 이러한 환자들에서 지속적 예방 목적으로 투여 시 권장용량 1일 1회, 1회 10mg 투여 시 뇌졸증 발생률이 증가하였습니다.
18) 출혈성 또는 열공성 뇌졸증 병력이 있는 관상 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환(PAD) 환자를 대상으로 연구되지 않았습니다. 그러므로 이런 환자들에게 이 약의 투여를 피해야 합니다. 개별 이내 허혈성, 비열공성 뇌졸증 병력이 있는 관상 동맥 질환(CAD) 또는 말초 동맥 질환(PAD) 환자에 대해서 연구되지 않았으므로 뇌졸증 후 첫 1개월은 이전의 투여를 피해야 합니다.
19) 항인지질항체증후군으로 진단받은 혈전증 병력의 환자에게 이 약을 포함한 DOACs(Direct acting Oral Anticoagulants)의 사용을 권장하지 않습니다. 특히 트리스항동고인자, 항카르디핀 항체 및 루푸스항인데이항응제 등 3종의 양성인 환자이면 DOACs을 이용한 치료는, 바판막 K 길항제와 비교하였을 때 재발성 혈전증 발생 위험의 증가와 연관이 있을 수 있습니다.

6. 상호작용
1) CYP3A4 및 P-gp 억제제
이 약과 강력한 CYP3A4 억제제인 아폴짜 항진균제에, 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 포사코나졸나 HIV 프로테아제 저해제에, 리토나비르의 병용투여는 권장되지 않습니다. 이러한 약물은 CYP3A4와 P-gp에 대한 강력한 저해제로, 리바록사반의 혈장농도를 임상적으로 유의한 수준(평균 2.6배)으로 증가시켜 출혈위험이 증가될 수 있습니다. 그러나 아폴제 항진균제인 플루코나졸의 경우 병용투여시 리바록사반의 노출에 미치는 영향이 덜 적으로 이 약과 병용시 주의해서 투여할 수 있습니다.
① 케토코나졸 또는 리토나비르
이 약을 케토코나졸(400 mg, 1일 1회) 또는 리토나비르(600 mg, 1일 2회)와 병용투여한 경우, 리바록사반의 평균 AUC는 각각 2.6배 및 2.5배, 평균 C_{max}는 각각 1.7배 및 1.6배 증가하였고, 출혈적으로 약학적의 효과과 유의에게 증가하여 출혈 위험성이 증가될 수 있습니다. 리토나비르 이용계 항진균제에, 케토코나졸, 이트라코나졸, 보리코나졸, 포사코나졸나 HIV 프로테아제 저해제에, 리토나비르로 병용시료를 받고 있는 환자에 대해 이 약의 투여가 권장되지 않습니다. 이러한 약물은 CYP 3A4와 P-gp에 대한 강력한 저해제로, 병용투여 시 리바록사반의 혈장 농도를 임상적으로 유의한 수준으로 증가시켜 출혈위험을 증가할 수 있으며 간 및 신장의 청소율 감소를 유발하여 전신노출을 유의적으로 증가시킬 수 있습니다.
② 클래리트로마이신
CYP3A4에 대해 강한 저해효과를 갖고 P-gp에 대한 중등도의 저해효과를 갖는 클라리트로마이신(500 mg, 1일 2회)은 이 약의 평균 AUC를 1.5배, 평균 C_{max}를 1.4배 증가시켰습니다. 클래리트로마이신의 상호작용이 대부분의 환자에게는 임상적으로 유의하지 않을 수 있지만, 고위험군 환자에에는 잠재적으로 유의할 수 있습니다.
③ 에리트로마이신
CYP3A4와 P-gp에 대해 중등도의 저해효과를 갖는 에리트로마이신(500 mg, 1일 3회)의 경우, 이 약의 평균 AUC와 평균 C_{max}를 각각 1.3배 증가시켰습니다. 에리트로마이신의 상호작용이 대부분의 환자에게는 임상적으로 유의하지 않을 수 있지만, 고위험군 환자에에는 잠재적으로 유의할 수 있습니다.
④ 플루코나졸
CYP3A4에 대해 중등도의 저해효과를 갖는 플루코나졸(400 mg, 1일 1회)은 이 약의 평균 AUC를 1.4배, 평균 C_{max}를 1.3배 증가시켰습니다. 플루코나졸과의 상호작용이 대부분의 환자에게는 임상적으로 유의하지 않을 수 있지만, 고위험군 환자에에는 잠재적으로 유의할 수 있습니다.
2) CYP3A4 유도제
이 약과 강력한 CYP3A4 유도제인 리팜피신의 병용투여시 평균 AUC가 50% 감소하였고, 약학학적 효과가 에어 상당하게 감소하였습니다. 리바록사반과 다른 강력한 CYP3A4 유도제제, 페니토인, 카르바마제핀, 페노바비탈 또는 St. John's Wort(성요한초)의 병용투여시 이 약의 혈중 농도가 감소될 수 있으므로 주의해서 투여하도록 합니다.
3) 항응고제
리바록사반(10 mg, 1일 1회)과 에녹사파린(40 mg, 1일 1회) 병용투여시 응고검사(PT, aPTT)에 대한 부가적인 효과없이 항응고인자 Xa의 활성에 대한 상가적인 효과가 관찰되었습니다. 에녹사파린은 리바록사반의 약동학에 영향을 미치지 않았습니다. 다른 항응고제를 병용투여하는 경우 출혈 위험성이 증가되므로 주의해서 투여하도록 합니다.
4) NSAIDs/혈소판 응집 억제제
리바록사반 15 mg과 리바록사반 500 mg을 병용투여시, 임상적으로 유의한 출혈시간 지연이 관찰되지 않았으나, 개인에 따라 큰이 현저한 약학학적 반응이 나타날 수 있습니다. 리바록사반과 아세틸살리실산 500 mg과 병용투여시 약동학적 상호작용은 관찰되지 않았습니다. 그러나 아세틸살리실산과 약학학적 상호작용이 관찰되지 않았습니다. 클로피도그렐(초회용량 300 mg 투여 후, 75 mg 유지용량과 이 약 15 mg과의 약동학적 상호작용은 관찰되지 않았으며, 혈소판 응집 P-selectin 또는 GPIIb/IIIa 수용체 농도와 무관한 환자군에서 출혈시간 연장이 관찰되었습니다. NSAIDs(아세틸살리실산 포함), 혈소판 응집 억제제를 병용투여하는 경우 출혈 위험성이 증가되므로 주의해서 투여하도록 합니다.
5) 와파린
와파린(INR 2.0~3.0)에서 이 약(20 mg)으로 바꾼 경우 혹은 이 약(20 mg)에서 와파린(INR 2.0~3.0)으로 바꾼 경우, 프로트롬빈시간(PT)에서 INR(International Normalized Ratio)로 측정되는 효과의 INR값이 증가된 것이 관찰 되었습니다. aPTT, 응고인자 Xa 활성 저해 및 내인적 트롬빈 잠재성에의 영향은 가산성이 관찰되었습니다. 와파린과 이 약과의 약동학적 상호작용은 관찰되지 않았습니다. 이 약은 CYP3A4와 같은 주요 CYP isoform을 저해하거나 유도하지 않습니다.
7) 항생간제제에 대한 상호작용
리바록사반은 적용기전에서 예상되는 대로 응고파라미터 (PT, aPTT, Hep Test와)에 영향을 미칩니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임부 : 임부에 대한 안전성 유효성이 확립되지 않았습니다. 랫드와 토끼를 이용한 동물시험에서 이 약의 약학학적 작용 양식에, 출혈성 합병증과 관련된 태반변화와 함께 투여한 모독성이 나타났고, 이는 생식독성을 유발할 수 있습니다. 주요한 기형발생의 가능성은 확인되지 않았습니다. 출혈에 대한 내인적 위험성과 리바록사반의 태반통과로 인하여 이 약은 임신기간 중 투여를 금합니다. 임신 가능성이 있는 여성인 경우, 이 약을 투여하는 동안 반드시 깨임을 해야 합니다.
2) 수유부 : 수유부에 대한 안전성 유효성이 확립되지 않았습니다. 랫드를 이용한 동물 시험에서 이 약은 유즙으로 분비되었습니다. 따라서 이 약은 수유기 중단 혹은 중단 회에는 투여할 수 없습니다.

8. 고령자에 대한 투여
주로 신장 청소율 및 연령과 같은 요인에 영향 받았던 것으로 고령자(65세 초과)에서 혈장농도가 더 높게 나타났습니다(평균 AUC값이 약 1.5배 상승). 고령자에서 용량조절은 필요하지 않습니다. 연령이 높을수록 출혈 위험성은 증가할 수 있습니다.

9. 소아 및 청소년에 대한 투여
만 18세 미만의 소아 및 청소년에 대한 안전성 유효성은 확립되어 있지 않았으므로 이 약의 투여가 권장되지 않습니다.

10. 과량투여시의 처치
출혈성 합병증 또는 다른 이상반응없이 600 mg까지 과량투여된 경우가 드물게 보고되었습니다. 제한적인 증수 때문에 평균 혈장 농도에 있어서 이 아상의 증가가 없는 천정효과는 50 mg 또는 그 이상의 치료용량을 상회하는 용량에서 기대됩니다. 이 약의 약학학적 효과에 길항하는 특정 해독제는 없습니다. 과량투여한 리바록사반의 증수를 감소시키기 위해 약물전의 사용을 고려할 수 있습니다. 활성결합물이 놀기 때문에 이 약은 투석이 가능할 것으로 예상되지 않습니다.

11. 운전 및 기계 작동에 미치는 영향
운전 및 기계 작동에 미치는 영향을 평가하기 위한 연구는 수행된 바 없습니다. 수술 후 심신, 출혈 등이 보고된 적이 있으므로, 운전 및 기계작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 아상반응을 경험한 환자는 운전하나 기계 작동을 하지 말아야 합니다.

12. 임상시험 정보
1) 스텐트 시술의 경피적 관상동맥중재술(PCI)을 받은 비판막성 심방세동 환자
무작위배정, 라벨 공개, 다군 임상시험(PIONEER AF-PCI)에 2,124명의 스텐트 시술의 PCI를 받은 비판막성 심방세동 피험자를 대상으로 27시 리바록사반 치료군과 비타민K 길항제 투여군을 비교하기 위해 수행되었습니다. 대상자들은 무작위로 배정 되었고 총 12개월의 투여를 받았습니다. 1, 2등, 일과성허혈발작의 병력이 있는 환자는 포함되지 않았습니다. 그룹1은 리바록사반 15mg 1일 1회(크레아티닌 청소율 30-49mg/min 환자의 경우 10mg) 1일 1회 + P2Y12 억제제(클로피도그렐 75 mg)또는 대체 P2Y12 억제제를 1일 1회 투여하였습니다. 그룹2는 리바록사반 2.5mg 1일 2회 + DAPT(dual antiplatelet therapy 에, 클로피도그렐 75 mg)또는 대체 P2Y12 억제제 + 저용량 아스피린)를 미리 정해진 1, 6 또는 12개월 동안 투여하고 이어서 리바록사반 15mg(크레아티닌 청소율 30-49mg/min 환자의 경우 10mg) 1일 1회 + 저용량 아스피린을 투여하였습니다. 그룹3은 비타민K 길항제 + DAPT를 미리 정해진 1, 6 또는 12개월 동안 투여하고 이어서 비타민K 길항제 + 저용량 아스피린을 투여하였습니다. 1차 전진성 평가변수는 임상적으로 유의한 출혈이며 그룹1, 그룹2 및 그룹3에 각각 109(15.7%), 117(16.6%), 167(24.0%)건 발생하였습니다. (각각 HR 0.59; 95% CI 0.47-0.76; p<0.001, HR 0.63; 95% CI 0.50-0.80; p<0.001). 2차 평가변수는 심혈관계 사망, 심근경색, 스텐트 혈전증(definite or probable)의 복합(심혈관계 사망, 심근경색, 혈전색전증)에 그룹1, 그룹2 및 그룹3에 각각 41(5.9%), 36(5.1%), 36(5.2%)건 발생하였습니다. 스텐트 시술의 PCI를 받은 환자에서 리바록사반 투여군인 그룹1 및 그룹2는 비타민K 길항제 투여군인 그룹3과 비교하여, 임상적으로 유의성 있게 출혈의 감소를 나타내었습니다. PIONEER AF-PCI 임상시험의 자 특징은 연전성 평가이며, 이러한 환자에서의 유효성 자료는 제한적입니다.
2) 심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 치료/심재성 정맥혈전증 및 폐색전증의 재발 위험 감소
EINSTEIN CHOICE에서 6-12개월의 항응고 치료를 완료한 증상이 있는 심재성 정맥혈전증 (Deep Vein Thrombosis, DVT) 그리고/또는 폐색전증(Pulmonary Embolism, PE) 환자 3,396명을 대상으로 치명적인 PE 또는 비치명적인 증상이 있는 DVT 또는 PE의 재발 감소에 대해 연구되었습니다. 자속적으로 치료받의 1예씩서 용량 조절된 항응고제 치료에 대한 적응증이 있는 환자는 제외되었습니다. 치료기간은 개별 무작위배정일에 따라 12개월(증상은 351일)까지였습니다. 리바록사반 20mg 1일 1회 투여 및 리바록사반 10mg 1일 1회 투여와 아스피린 100mg 1일 1회 투여와 비교하였습니다.
1차 유효성 평가 변수는 증상이 있는 재발성 VTE로, 재발성 DVT 또는 치명적 또는 비 치명적 PE로 구성된 복합변수였습니다. 2가 유효성 평가 변수는 1차 유효성 평가변수, 심근경색, 허혈성 뇌졸증, 또는 비-중추신경계 전신 색전증으로 구성된 복합 변수였습니다.
EINSTEIN CHOICE연구에서 리바록사반 20mg과 10mg은 모두 1차 유효성 평가 변수에서 아스피린 100mg보다 우월하였습니다. 2차 유효성 평가변수는 아스피린 100mg 대비 리바록사반 20mg 또는 10mg에서 유의하게 감소하였습니다. 1차 안전성 평가변수 (주요 출혈 사건)에서 리바록사반 20 mg 및 10 mg 1일 1회 투여는 아스피린 100mg 1일 1회 투여와 유사하였습니다. 1차 유효성 평가변수 (14 일 초과 치료 중단과 관련된 비주요 출혈)는 리바록사반 20mg 또는 10mg과 아스피린 100mg을 비교 시 유사하였습니다.
EINSTEIN CHOICE의 순 임상적 이익성 분석(net clinical benefit, 앞자 유효성 평가변수 + 주요 출혈 사건) 분석에서 아스피린 100 mg 1일 1회와 비교시, 리바록사반 20 mg 1 일 1회 투여의 위험비(HR)는 0.44 (95 % CI 0.27 – 0.71, p = 0.0009), 리바록사반 10 mg 1 일 1회 투여의 위험비(HR)는 0.32 (95 % CI 0.18 – 0.55, p <0.0001)로 보고되었습니다.

<표2> EINSTEIN CHOICE의 안전성 및 유효성 결과

연구분단	3,396명에서의 정맥혈전색전증의 자속적인 재발 위험감소		
치료용량 [사분위수 범위]	리바록사반 20mg 1일 1회 (N=1,107)	리바록사반 10mg 1일1회 (N=1,127)	아스피린100mg 1일1회 (N=1,131)
치료기간 중위값	349 [189~362] 일	353 [190~362] 일	350 [186~362] 일
증상이 있는 재발성 VTE	17 (1.5%)	13 (1.2%)	50 (4.4%)
- 증상이 있는 재발성 PE	6 (0.5%)	6(0.5%)	19. (1.7%)
- 증상이 있는 재발성 DVT	9 (0.8%)	8 (0.7%)	30 (2.7%)
- 치명적 PE/PE를 제외한 수 없는 사망	2 (0.2%)	0	2 (0.2%)
증상이 있는 재발성 VTE, 심근경색, 뇌졸중, 비 - 중추신경계 전신 색전증	19 (1.7%)	18 (1.6%)	56 (5.0%)
주요 출혈