

양배추 유래성분 MMSC 위장약 제트유플러스정

성 상	초록색의 원형 필름코팅정
원료약품 및 그 분량	1정(711.1밀리그램) 중 • 유효성분 탄산수소나트륨(KP) 150mg 침강탄산칼슘(KP) 200mg 수산화마그네슘(KP) 16.7mg 스코폴리아엑스3배산(별규) 15mg 메틸메티오닌설포늄염화물(KP) 25mg • 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호 • 기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 분말셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파글로스투명(NA-7150), 오파드라이흰색(03B28796), 오파드라이amb II 녹색(88A610048), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 코포비돈, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스
효능·효과	위산과다, 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림
용법·용량	만 15세 이상 및 성인 1일 3회, 1회 2정씩 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.
사용상의 주의사항	1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 수유부(모유로 이행해서 젖먹이의 맥박이 빨라질 수 있다) (2) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. (1) 위장진통·진경(경련완화)제 3) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. (1) 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타나는 사람 (2) 신장장애 환자 (3) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 (4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 4) 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것. (1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)이 나타날 경우 (2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타날 경우

- (3) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
(4) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
5) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
(2) 나트륨 제한 식이를 하는 사람
6) 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

사용기간	제조일로부터 24개월
포장단위	30정(10정/PTP x 3)
저장방법	밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
설명서개정연 월일/관리번호	2021.08.02 / P2109-01

※본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
※의약품을 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※첨부문서 최종 개정연월일(2021.08.02)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
※부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

【제조의회사】



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.il-yang.co.kr

【제조사】



PHARVIS (주) 한국파비스제약

KOREA 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127