



효과 빠른 생약 성분 소염제

마이썸 캡슐

(배농산급탕)

일반의약품
분류번호: 263

【성분 · 함량】 1캡슐 중

유효성분 : 지실 (KP)	0.50g
작약 (KP)	0.50g
길경 (KP)	0.67g
건강 (KP)	0.17g
대추 (KP)	0.50g
감초 (KP)	0.50g
이상물건조엑스로서	405mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색4호, 황색5호

기타첨가제 : 경질무수규산, 캡슐

【성상】 암갈색의 분말이 충전된 상, 하부 미황색의 캡슐제

【효능 · 효과】 발적(총혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(괴음)성질환

【용법 · 용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 발적(총혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열 등의 전신 증상을 동시에 수반하는 환자
- 2) 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)), 만성증기 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감령(줄임)하는 등 주의하십시오.)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 지금까지 약에 의해 발진 · 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않습니다(사용경험이 적습니다.))
- 9) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여해야 합니다.
- 10) 이 약은 황색5호(선택염료 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여해야 합니다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨 혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.

(3) 피부 : 발진 · 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등

(4) 소화기계 : 위부불쾌감 등

2) 5~6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐

【제품문의】 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

- ※ 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환 하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 본 설명서 작성일 이후에 변경된 내용은 아래 제품 문의 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 통하여 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조의뢰자 : **신일제약(주)**

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

제조사 : **경방신약(주)**

인천광역시 남동구 남동대로 394



설명서 개정년월일 : 2021.05.17