

일반의약품

세레민정

(은행엽건조엑스)

Ginkgo Biloba Leaf Dried Extract 240mg

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(EP) 240mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라아녹색(03B41083), 클로이드성아산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

【성 상】연두색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

【용법·용량】

은행엽건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용한다. 식사와 관계없이 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 18세 미만의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 18세 미만의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 임부(동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신 중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(정당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 부도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

- 항응고제(예: 펜프로쿰론, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)와 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 둘의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없다.
- 다른 의약품과 마찬가지로 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있으므로 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 한다.
 - 이 약을 니페디핀 및 딜티아젤과 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률이 영향을 미침으로써 이들 물질의 혈장 수준이 더 높아질 위험이 있다.
 - 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 혈장 수준이 나타날 위험이 있다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿰론, 와파린), 항혈소판제(예: 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
- 수유부(무유로 이행 여부가 알려지지 않음)
- 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 수술이 예정된 자
- 이 약을 복용(사용) 시 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 한다.
- 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 한다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 한다.

3) 이상반응

- 드물게 가벼운 위장관 불편감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - 위장 장애: 오심(구역) 등의 위장관 증상
 - 신경계: 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
 - 피부: 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있다.
- 경기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었다.
- 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
- 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응을 보고가 있다. 다만, 이로써 해당 성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아, 단단히 마개로 막아) 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 20정/피티피(10정/PTP X 2), 30정/병, 300정/병

- ※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견된 경우 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2025년 2월 18일) 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 홈페이지(www.intropharm.com)를 통하여 확인하실 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기간이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 의약품은 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 피에구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)으로 문의 바랍니다.

PIG07T30 E01

【제조자】 (주)인트로바이오파마 경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12, 104-2 1층 1층(일부) 및 2층(일부)(보관소)

>> 접지 후 모습

일반의약품

세레민정

(은행엽건조엑스)

Ginkgo Biloba Leaf Dried Extract 240mg

날짜	2025년 2월 18일	기타		
고객사	인트로바이오파마	색상	박색(K85) —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●친화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐릴 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 있습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.
제품명	세레민정			
유형	접지설명서			
인쇄	변양면 □단면			
규격	138×175mm			
접지규격	138×35mm	폰트	- 제품명 : 7포인트 이상 - 일반의약품 문구 : 7포인트 이상 - 본문 : 7포인트	※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에게 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.
재질	모조 70g			
관리번호	PIG07T30 E01			
※ 인쇄전행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.				

스터키 / 설명서 제작업체
이추무공화LNB 매뉴얼 

- 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
- 전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요.
- 빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요.
- 같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이진 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

- ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다.
- ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.