

베로타이엑스정

【원료약품의 분량】 1정(190mg) 중

- 유효성분 : 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
디아스타제 · 프로테아제 · 셀룰라제(KP)(전분호정화력(pH4.5) 160단위이상, 전분당화력(pH4.5) 69.5단위이상, 단백소화력(pH3.0) 42.5단위이상, 섬유소당화력(pH4.5) 0.5단위이상) 5mg
리파제(KP)(지방소화력(pH6.0) 30단위 이상) 5mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(19W623)

【성상】

흰색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체할, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

성인(15세 이상)은 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 만 7세 이하의 어린이
 - 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 1000정/병

【제조사】 한국신텍스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 106

【소비자상담실】 063-853-8110

※ 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://hedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
 ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환하여 드립니다.
 ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 피해 구제 신청을 할 수 있습니다.

개정일 20230728